

PHARMACOPOEA

DANICA

MEDIOLANI

MDCCCXXVI

Excudebat Societas Typogr. Classicorum Italiae Scriptorum

Sumptibus Editoris.

LECTURIS

S.

Jam dudum Pharmacopoeae Danicae recudendae animadverti coepit necessitas, quum editionis, quae anno 1772 prodierat, exemplaria distracta repertuque difficillima essent. Multis jam abhinc annis Collegium medicum una cum Regia Societate susceperat consilium subeundi molestum hunc non minus ac salutarem laborem. Ejus tamen perficiendi curam relictam sibi vidit novum Sanitatis Collegium, quod anno superiore e Collegii medici et Academiae chirurgicae membris aliisque viris peritis constitutum, jussu Regio in illius locum ac munia successit, operamque in absolvenda nova Pharmacopoeae diu desideratae editione collocatam, omnium primam gravissimamque esse censuit.

Longe simplicior recentioris medicinae facies, multorum medicamentorum antiquiorum inutilitas, nonnullorum recentiorum nondum usu satis comprobata agendi facultas

una cum esimio, quem ars Chemica nostro aevo fecit progressu, insignes postulavere mutationes, multasque cautiones adhibendas suaserunt.

Duplex inprimis nos sollicitos habuit desiderium, alterum, ne remediorum apparatus justo nimis augeretur, verum potius provide, absque ullius idonei neglectu, restringeretur; alterum eo tendens, ut Medicis practicis esset copia, inter medicamenta virtute paria, ea deligendi exhibendique in usus, quae propositis finibus obtinendis inprimis apta et accommodata iis visa essent. Hinc dedimus operam, ut inter medicamentorum numerum nimis largum atque angustum media a nobis via teneretur, quod quidem studium, quousque nobis successerit, penes aequos peritosque lectores esto judicium.

Grati profitemur nos e nonnullarum Pharmacopoearum recentiorum luce nutibusque profecisse, neque cujusvis nostri Collegii Sodalium usum diuturnum et experientiam multiplicem consulere negleximus.

Pharmacopoea nostra in duas divisa partes est. Priori continetur materia pharmaceutica, seu eorum medicamentorum, quae

retinenda esse duximus, recensus. Complectitur non modo simplicia, sed ea quoque praeparata, quae, quum commode hic parari nequeant, peregre advehi necesse sit.

Ordinem sequuti sumus sequentem. Primo loco habetur cujusvis medicamenti nomen officinale. Sequuntur ejusdem nomina vernacula, quantum fieri potuit, in Dania, Norvegia, Islandia, Laponia cet. consueta, denique Teutonica. Ea tandem excipit Linnaeanum, addita Classium et Ordinum, ad quos illud pertinet, mentione, ejusque descriptione succincta. Quibus praemissis subjiciuntur Characteres sensus potissimum ferientes, saporis, odoris, nec non figurae cujuscunque fere simplicis; locus natalis, tempus collectionis et inprimis notae bonitatis. Neque desiderantibus in medicamentis e regno vegetabili receptis, deest designatio tabulae aeneae, quae in Florae Danicae illustri opere ejus figuram exhibet.

Parte posteriore medicamenta composita et praeparata comprehenduntur. Hic quoque diu haesimus suspensi, utrum chemica nomenclatura recentior a nobis recipienda, an servanda antiquior esset. Hinc aderant causae verendi, ne nova vocabula minus pe-

ritos tabernarum medicarum ministros in errores inducerent, iisque varia miscendi turbandique ansam praeberent; illinc probabilis exspectatio, non adeo procul abesse tempus, quo antiqua recentioribus locum cessura sint; et omnino commendabilior ratio ea visa est, qua medicamentorum denominatio potius a partium constituentium natura, quam virtute medica, peteretur. Inde et hic mediam inire viam conati sumus, ut adeo et antiquiora et recentiora nomina, cum in ordine alphabetico generali, tum in indice commemorata reperiantur, quo ea quaerendi noscendique difficultas nulla erit.

In remediorum extemporaneorum delectu cautam parsimoniam adhibuimus, ut non nisi perpauca admissa invenientur. Persuasum enim nobis habuimus, Pharmacopoeam unice ad pharmaceuticas chemicasque notiones referri debere; neque dubitavimus, doctum quemvis facili negotio e medicamentorum apparatu copioso formulas suas compositurum. Accedit, quod in notis formulis applicandis saepius singularia momenta atque indicia obveniant, quorum habita attentius ratione illas immutari oportet; nimiae vero formularum copiae facilis sit abusus,

ad adjuvandam adaugendamque malam medicastrorum sedulitatem, unde ad rempublicam infanda damna redundant. Agyrtis vero hisque, quorum ad aegrotantis cubile perfugium est formularum pharmaceuticarum sylloge, nostram Pharmacopoeam inservire noluimus.

Praeparationes chemicae ex parte sunt multo simpliciores redditae, omnes vero, quoad fieri potuit, accuratissime institutae. Conspicua nostrorum pharmaceuticorum Sodalium Beckeri et Mantheyi, virorum peritissimorum solertia, nos de illarum explorata fide esse certissimos jubet.

Quum ob emptorum paucitatem fieri omnino nequeat, ut oppidorum minorum tabernae medicae pleno medicamentorum apparatu instructae sint, delectum maxime necessariorum, quae in omnibus minoribus pharmacopoliis praesto esse debeant, in calce subjunximus.

Tandem adjecta est Taxa medicinalis; quae tamen e jussu Regio, prout commerciorum vicissitudines aliaeque rationes id postulaverint, annuis mutationibus erit obnoxia.

Caeterum gravitatem et difficultatem laboris a nobis suscepti omni ambitu suo

III. Mensura nostra ordinaria (Pot) est librarum duarum ponderis civilis.

IV. Herbarum florumque pondus in praescriptionibus per fasciculos, manipulos et pugillos determinari solet. Praestat vero et his pondus exactum assignare. Sit igitur *Fj* (Fasciculus) unciae unius, *Mj* (Manipulus) uncia semis, *Pj* (Pugillus) drachmae unius ponderis.

CANONES

MATERIAE PHARMACEVTICAE PRAEMITTENDI

A. *Pro Fungis.*

I. Cito siccati ab heterogeneis admistis liberentur.
II. Serventur loco sicco, ne mucorem contrahant.

B. *Pro Radicibus.*

I. Annuae Radices, quarum parcissima tamen in nostris pharmacopoliis copia est, evellentur, antequam caules floresque protruserint. Biennes altero, ex quó sata sunt, vere eruantur. Si vero inopia urget, autumno ejusdem anni, quo sata sunt, postquam folia caulesque emarcuere, colligi possunt. Perennes perinde est, vere an autumno effodiantur. Autumno tamen pleraeque sunt si non efficaciores, certe aquoso succo non adeo turgidae.

II. In delectu Radicum, spongiosae, farinaceae, cariosae, inprimis vero exsucco cortice tectae, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum ostendit perfectus torosusque corticis habitus.

III. Quae principiis aromaticis et resinosis praeditae sunt Radices, lotione non purgentur. Sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur.

IV. Praegrandes et succulentae Radices, in taleolos dissectae serventur.

V. Siccentur cito Radices aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. Siccatae frigido siccoque loco serventur, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coerceantur vasis.

VII. Patriae nostrae inquilinae, tum succulentae multum gummosae, tum etiam subtilibus et facile avolantibus viribus praeditae, quotannis recentes legantur aut arcessantur.

VIII. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus inest; ut Armoraciae, Iridis, Ari, Scillae, Bryoniae, opportuna tempestate collectae, sabulo sicco reconditae serventur.

C. *Pro Lignis, Corticibus et Stipitibus.*

I. Stipites versus autumnum, quo tempore succo efficaci probe cocto scatent, resecentur.

II. Cortices e fruticibus autumno ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. Ligna hiberno succidentur tempore.

D. *Pro Herbis, Foliis et Gemmis.*

I. Turiones gemmaeque primo vere, quo tempore turgidulae sunt, et ante explicationem foliorum decerpantur.

II. Herbae colligantur adultae cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint. Quae semper virent, quovis tempore colligere licet, vernum tamen praestat.

III. Folia colligenda sunt tempestate sicca non diu post ortum Solis, simulac rorem, quo nocte canescunt plantae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero, postquam defloruerit et antequam maturuerit planta.

IV. Herbae indigenae quotannis recentes comparari debent. Effoetae superstites pro sale alcali Herbarum (Kali) parando adhiberi possunt.

V. Exsiccatio herbarum citissime fiat aut calido umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

E. *Pro Floribus.*

I. Flores decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploserint, quamprimun radii Solis rorem dissipaverint.

II. Coma florens colligenda, dum flos explicari incipit.

III. Siccentur ut herbae, et quidem, quam fieri potest, citissime.

F. *Pro Seminibus.*

I. Semina colligantur perfecte matura, antequam sponte excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo.

II. Quae capsulas, involucra etc. retinent Semina, ea his munita serventur.

III. Plerumque autem Seminum delectus ita instituendus est, ut aquae immittantur, et quidquid

supernatat, abjiciatur: quod vero fundum petit, iterum siccetur.

G. *Pro Fructibus.*

Fructus non nisi maturi decerpantur, si excipias Acaciae et Aurantiae fructus, de quibus infra.

PARS PRIMA

MATERIA PHARMACEVTICA

ABROTANUM. Abrod. Eberraute; Gertwurzel; Gertkraut.

Artemisiae Abrotani, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA. Planta frutescens Europae meridionalis et Orientis, apud nos in hortis colitur. Colligenda mense Augusto cum summitatibus. Odoris est fragrantis grati; saporis amaricantis aromatici.

ABSINTHIUM VULGARE. Malurt. Gemeiner Wermuth.

Artemisiae Absinthii, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA. Colitur in hortis et nonnunquam sponte provenit in ruderatis, maritimis aridis et ad vias. Planta perennis, mense Augusto colligenda cum summitatibus. Odoris est nauseosi gravisque; saporis intense amari. Flor. Dan. Tab. 1176.

ACACIA NOSTRA. Slaaetorn; Kreygebärtorn. Steckdorn.

Pruni spinosae, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., FLORES. Frutex humilis in dumetis et ad sepes

ungulae equinae figurae, supra corticosus, infra fistulosus sive porosus, in medio mollis, superne fulvus, interdum fasciis discoloribus, inferne pallidior sive albidus. In caudicibus Betularum, Quercuum, Tiliarum et Fagorum nascitur, mensibus Augusti et Septembris colligendus, deinde praeparandus coctione, exsiccatione et malleatione. Inodorus et insipidus est.

AGARICUS MUSCARIUS. Fluesvamp. Fliegenschwamm.

Agaricus muscarius, Linn. Cl. XXIV. ord. Fung., FUNGUS venenatus frequens silvarum incola, pileo coccineo, albis verrucis obsesso. Odoris vehementer ingrati; saporis urentis. Infima pars radicis terrae inhaerens colligatur. Flor. Dan. Tab. 1129.

ALKANNA RUBRA, sive SPURIA; ANCHUSA; BUGLOSSUM. Rod Dretunge. Rothe Dchsenzunge.

Anchusae tinctoriae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX perennis, teres, oblunga, foras rubens aut nigricans. Eligantur radices parvae, fibrosae, quae colorem purpureum in tota substantia in magis diffusum habent. Majores intus albicant. Odorem habent nullum; saporem mucidum. Habetur ex Hispania et Gallia meridionali.

ALLIUM. Hvidlog. Knoblauch.

Allii sativi, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX bulbosa, tunicata, ubique in hortis culta. Odor proprius; sapor acris, subdulcis. In sabulo servanda.

ALOË. Aloe. Aloe.

Aloës spicatae et *Aloës perfoliatae*, Linn. Cl. VI. ord. Monogy., perennis, in utraque India cultae, SUCCUS gummeo-resinosus, inspissatus, *Caballina* impura hippiatris relinquitur, et quae ex hac fraudulenter parata Aloë pura splendensque pro succotrina venditur, ingrato, nauseoso sapore atque odore se prodit. Praestantior ejus species est *Succotrina* ex Alexandria advecta, e foliis collecta, quae, dum proba est, splendet et pellucet, unde lucida salutatur, habetur ex Aloë perfoliata. Coloris est ex spadiceo fusci, comminuta, ex aureo fulvi. Calore manus flexilis est. Saporis multum amari, non ingrati tamen et paulum aromatici Odoris, Myrrham mentientis, gummosae magis indolis quam Hepatica; quae habetur ex Aloë spicata, obscurior est opaca, compactior; colorem habet profundiorem et superficiem non adeo splendentem; odoris est fortioris magis ingrati; Saporis amaricantis magisque nauseosi. Vilissima species est *Caballina*; coloris nempe longe obscurioris fereque nigri; Odoris foetidi ob multam copiam resinae, sordium sabulique ingratissimi. Habetur ex Aloë spicata, et advehitur in putaminibus cucurbitarum ex Indiis et China; vilior autem in cadis ex insulis americanis, praecipue Barbados insula, adfertur.

ALTHEA; BISMÁLVA. Althee. Althee; Eibisch.

Altheae officinalis, Linn. Cl. XVI. ord. Polyandr., RADIX. Planta perennis hortis culta, at sponte hinc

et inde proveniens, radicem dat albam, digiti crassitudinis, mucilagine turgidam, odoris nullius, saporis subdulcis mucilaginosi. Flor. Dan. Tab. 530.

Ejusdem FOLIA cordata, tomento cinereo obducta, mense Julio colligenda.

ALUMEN CRUDUM s. VULGARE. Allun. Allaun. Est SAL medium terrestre a terra argillacea, pauxillo Kali et acido sulphurico compositum, postremo tamen praeponderante. Crystalli sunt octaëdrae pellucidae, saporemque habent dulcescentem et adstringentem. Multam praeterea habent aquam crystallisationis. Sit splendens, subpellucidum nec ferro inquinatum. Habetur e Norvagia et Scania. Advehitur ex Anglia, Germania et Italia.

AMMONIACUM GUMMI. Ammoniak. Gummi Ammoniak.

Plantae ferulaceae adhuc ignotae SUCCUS gummeo-resinosus, externe obsolete flavus, interne ex albescente, rubente et obsolete flavo variegatus, lentus, et calore manus mollescens. Odoris nauseosi, alliacei, castoreati pauxillum spirantis, Galbano quodam modo similis, sed longe gratioris; saporis nauseosi amaricantis acriusculi. Praestat vel in granis angulatis variae magnitudinis, intus albidis atque inter se plerumque conglutinatis, vel in massis rotundis; tum granula albida substantiae molliori fuscae immixta sunt. Haec seminibus Ferulae haud dissimilia, et sabulo plerumque interpolata sunt. Advehitur ex India orientali et Aegypto, maxime e deserto Africae Barca. Pro usu interno nonnisi electum, puris-

simum, Thrausma veteribus dictum, adhibeatur i. e. vel Ammoniacum in puris granis emtum, vel grumi candidiores variegati, subsplendentes, e massa selecti. Quo uberiore horum unguium seu amygdalarum dictarum copia abundat, eo praestantius Gummi ammoniacum est. Quod jam colatum venditur, suspectum est; cum saepe nonnihil Peucedani immixtum sit.

AMMONIACUM SAL; AMMONIUM MURIATICUM. Salmiak. Salmiak.

Est sal neutrum ex Acido muriatico et Ammonio, nec non aqua crystallisationis constans. Inter antiquissima salia habebatur, in Aegypto ex fuligine stercorum animalium concrematorum paratum. Nunc vero Brunsvigae et aliis Germaniae locis, ac in Scotia et *in Gallia* fabricatur, et forma conorum, instar sacchari adfertur. Nativum etiam, montes ignivomi et *Calm*uccorum regio largiuntur. Crystallos habet plumosas; in modico calore totum sublimatur. Odoris est levissimi; saporis sensum frigoris linguae imprimentis, salini, urinosi. Eligatur candidum et purum, quod addito sale alcali fixo mox salis volatilis odorem spargit.

AMMONIUM MURIATICUM. Vid. *Ammoniacum Sal.*

AMYGDALAE DULCES. Sode Mandler. Süsze Mandeln.

Amygdalae communis, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., NUCLEI ex Europa australi allati. Sunt semina majora odore debili, sapore dulci et grato praedita, pellicula tenui, aequali, non rugosa e gilvo

cinnamomei coloris tecta. Sint recentes, siccae, fragiles, torosae, non rancidae nec vermibus exesae, aut maculis flavis intus conspicuis notatae.

AMYGDALAE AMARAE, praecedentium varietas; sunt semina varietatis cujusdam amygdali communis, fructu minore, saporis amaricantis in Laurocerasum incidentis.

AMYLUM. Kraftmeel; Stivelse. Kraftmehl.

Tritici hyberni et *Tritici turgidi*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., SEMINA in subtilissimum pulverem redacta, post elutionem principii gelatinosi et saccharini per aquam frigidam, subsidentem. Saporem habet farinaceum.

ANAGALLIS. Rodarve; Gaaseheel; Grine ved Dag; Grine ved Middag. Gauchheil; Bogelkraut; Hühnerdarm.

Anagallidis arvensis, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA et FLORES. Planta annua crescit in arvis et hortis. Mense Julio colligenda. Saporis est initio oleracei, postea amari cum acrimoniae sensu. Flor. Dan. Tab. 88.

ANCHUSA. Vid. *Alkanna*.

ANGELICA. Angelik; Quanne; Quannerod; Sloke; Sloike; Fatno; Fadnobusk; Fadnorvotas; Fadnoransse. Angelike.

Angelicae Archangelicae, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis oblonga ex capite crassiore in fibras saepe pollicares vel tenuiores divisa, extus e flavo

rubescens, intus alba, in Alpibus Norvagicis, Lapponicis sponte, apud nos in paludibus et hortis reperiunda; hyeme colligenda. In superficiebus segmentorum transversorum, alba, maculis numerosis flavis, oleo aethereo repletis notata. Odor aromaticus, fragrans, gratus; sapor aromaticus fortis, masticatae acris, mordens in lingua et faucibus cum calore. Sit tenax, abunde fragrans. Flor. Dan. Tab. 206.

ANGUSTURA; AUGUSTURA. Angustura. Angustura.

Bruceae ferrugineae vel *Magnoliae speciei* CORTEX duriusculus, fragilis, externe pallidus subcinerascens, rugosus subsulcatus, interne e luteo subfuscus laevis. Odor leniter aromaticus; sapor primo amygdalis amaris similis, deinde acris. In frustis plerumque latis subconcavis, interdum convolutis digiti crassitiei commixtis, ex America meridionali advehitur.

ANISUM. Annis. Anis.

Pimpinellae anisi, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN recens oblongo-rotundum, striatum, torosum, coloris viridiusculi; odoris suaveolentis; saporis dulciusculi cum levi aromate. Ex annua planta, in Germania copiose culta, advehitur. Eligantur semina magna matura, et stipitibus et impuritatibus liberata.

ANISUM STELLATUM. Stierneannis. Sternanis.

Illicii anisati, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., CAPSULAE SEMINALES, stellatae, coriaceae, fuscae,

seminibus ovatis nitidis repletae, coloris e cinereo spadicei subviriduli, odoris aromatici, saporis ex subdulci aromatici; quo majores sunt magisque odorae, eo sunt meliores.

ANTIMONIUM CRUDUM; STIBIUM; STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM. Spidsglands. Spieszglanz.

Est Minera metallica ex sulphure et regulo constans, per eliquationem in vasis clausis a matrice purgata, et crystallis acicularibus, nitentibus conspicua. Sit longis et splendentibus striis praeditum, et sub igne strenuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

AQUA PYRMONTANA. Pyrmontervand. Pyrmonterwasser.

Est aqua medicata martialis inodora, saporis acidulo-styptici.

AQUA SEDLICENSIS v. SEIDLICENSIS. Seidlitservand. Seidliszerwasser.

Est aqua medicata salina inodora, saporis amaricantis, salini, haud ingrati.

AQUA SELTERANA. Seltervand. Selterwasser.

Est aqua medicata alcalina, salina, vel carbonata, inodora, saporis lixiviosi haud ingrati.

AQUIFOLIUM. Christorn; Maretorn; Skovtidsel; Beenved. Hülsendorn; Stechpalmen.

Ilicis aquifolii, Linn. Cl. IV. ord. Tetragyn., FOLIA. Frutex in sepibus silvisque Helvetiae et Europae australioris nec non Holsatiae, sub umbra aliorum arborum sponte provenit; odorem nullum, saporem adstringentem habet. Flor. Dan. Tab. 508.

ARGENTUM. Solv. Silber.

Est metallum indigenum, album, auro levius, ductile, via sicca oxygenium respuens, in acido nitrico solubile, oxydatum cum acido muriatico connubium indissolubile contrahens. Pro parando caustico lunari cupellatum recipitur.

ARGENTUM FOLIATUM. Bladsolv.

Pro obducenda pillularum materia adhibetur.

ARGENTUM VIVUM. Vid. *Mercurius*.

ARMORACIA; RAPHANUS RUSTICANUS. Peberrod. Meerrettich.

Cochleariae armoraciae, Linn. Cl. XV. ord. Silicul., RADIX fusiformis, albida, succulenta, biennis, recens. Odoris fragrantis pungentis, penetrantis, oculos ferientis; saporis leniter amaricantis, dulcescentis, acris, fervidi, odori congrui. Recens sabulo servanda.

ARNICA. Bolverley; Guldblomme; Hesteblomme; Gionsockblomme, Hestsoloie; Stoksvaeve; Dikonge. Fallkraut; Wolferley.

Arnicae montanae, Linn. Cl. XIX. ord. Poly-

gam. superfl., HERBA. E montanis Bohemiae et Saxoniae locis allata, propter validiorem odorem alibi crescenti praefertur. Planta perennis ad altitudinem unius et dimidii aut duorum pedum excrescens, habet folia ovata, integra et nervosa, Plantaginis instar superficie utraque hirta, margine integerrimo, unde non confundenda est cum Inula dysenterica, cujus folia sunt oblonga subtomentosa. Saporem habet subacrem. Flor. Dan. Tab. 63.

Ejusdem FLORES sunt compositi lutei; digitis confricati, et naribus admoti, sternutationem ciunt. Squamulae calycinae breviores sunt non setosae, apicibus purpureis. Sapor ex acri-amarus.

ARSENICUM ALBUM. Rottekrudt. Ratzen- oder Mäusegift.

Oxydum Arsenici album, arsenicum oxydatum: sublimando paratum massam refert scoriformem, compactam, albam, subpellucidam, tempore opacam. In igne fumi instar avolat, odorem alliaceum spargens. Odoris caeterum nullius, saporis vero acris urentis, inflammantis.

ARUM. Dansk Ingefer. Deutscher Ingwer. Aaron.

Ari maculati, Linn. Cl. XX. ord. Polyandr., RADIX perennis inaequaliter globosa aut oblonga, tuberculis hirta, compacta, et crassitudinis pollicis. Verno tempore, antequam floret, colligatur. In locis umbrosis habitans, praeferenda illae, quae in apricis siccis offenditur. Per hyemem et aestatem, sabulo tecta servetur, quotannisque recens colligatur.

Recens sapore acerrimo praedita est, siccata autem acredine fere privata et farinosa; odoris nullius. Flor. Dan. Tab. 5o5.

ASA DULCIS. Vid. *Benzoës.*

ASA FOETIDA. Dyvelsdrek. Stinkender. Stinkender Asand; Teufelsdreck.

Ferulae asae foetidae, KAEMPFERO *Hingisch dictae*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI-RESINA, e radice sauciata potissimum elicita, ex Persia Indiisque allata; Odoris foetidissimi, tetri, ex alliaceo virosi; saporis amaricantis, acris, mordentis, diutissime inhaerentis. Sit gravissimo odore praedita, instar cerae flexilis et lenta, plurimisque massulis albentibus, luteis, roseis, murinis, amethystinis, cum splendore aliquo variegata.

ASARUM. Hasselurt. Haselwurzel.

Asari Europaei, Linn. Cl. XI. ord. Monogyn., RADIX perennis, fibrosa, recens. Coloris est ex cinereo fusci; Odoris nardini, Valerianae aemuli, subaromatici; saporis ex amaro acris, nauseosi. Sub calidiore Germaniae coelo germinat; rarius in Daniae provinciis. Flor. Dan. Tab. 633.

Ejusdem FOLIA in dumetis et circa radices corylorum semper virentia, mensibus Majo et Junio colligenda. Odorem habent nullum; saporem subaromaticum acrem.

ASPHALTUM; BITUMEN JUDAICUM. Iodebeeg. Iudenpech; Schlackichtes Erdpech; Asphalt.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens, magna copia mari mortuo, rubro, et aliis Asiae australis nec non Europae lacubus Asphalticis innatans. Vulgare, in fodinis Galliae aliarumque Europae provinciarum occurrit. Accensum odoris est ingrati: cum spiritu nitri fumante effervescit. Per destillationem hujus, Oleum Asphalti obtinetur, atrobrunneum, liquidum, in fila ductile, odoris ingrati, empyreumatici; sapore acri faucibus inhaerens.

AUGUSTURA. Vid. *Angustura.*

AURANTIA. Pomerantser. Pomeranzen.

Citri Aurantii, Linn. Cl. XVIII. ord. Icosandr., MALA, matura ex Europa meridionali advecta. Sunt globosa, non nihil depressa, umbilicata, externe vestiuntur cortice carnoso, interne pulpam habent membranosam, succulentam, vinosam, et seminibus subovatis sunt instructa; Odorem habent fragrantem et gratum; Saporem aromaticum ex amaro acidum. Poma aurantiorum immatura siccata, ipsius magnitudinis, coloris fusci nigricantis.

Eorundem CORTICES odoris fragrantissimi; saporis grate amari. Recipiantur tantum exteriores partes, quae flavedinis nomine distinguuntur, olei aetherei in superficie externa divites.

Eorundem FLORES, NAPHAE FLORES. Drangeblomster. Pomeranzblüthen.

Recentes habent odorem suavissimum, sicci fere nullum; saporem amaricantem.

Eorundem FOLIA. Pomerantsblade. Pomeranzenblätter.

Sunt ovata, appendice cordata ad basin aucta. Odorem habent manu trita grate fragrantem; saporem amarum.

AURANTIORUM CURASSAVIENSIUM CORTICES amariores, hinc praestantiores sunt.

AXUNGIA PORCI. Svinefidt. Schweinsschmalz; Schmeer.

Pinguedo molliuscula, depurata, alba, e mesenterio hausta. Sit recens et minime rancida.

B

BALSAMUM CANADENSE. Vid. *Terebinthina.*

BALSAMUM COPAIVAE; BALSAMUM de COPAHU. Copaivabalsom; Copaivabalsam.

Copaiferae officinalis, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LACRYMA oleoso resinosa, ex arbore in America meridionali, praesertim in Brasilia germinante, incisione facta magna copia stillans. Praestat balsamus limpidior dilutiorque, tum consistentia liquida, tum colore flavescente, odore fragrante et sapore non ingrato amaro linguaeque diu inhaerente praeditus, qui successu temporis tenax evadit, et consistentiam melleam adipiscitur. Rejiciatur opacus non tenax, subturbidus, fragrante odore destitutus, cujus in fundo deprehenditur liquor aquosus turbidus. Adulteratur praesertim Terebinthina, oleo expresso unguinoso uti amygdalarum dulcium, nupta. Inno-

tescit hoc partim e colore non adeo flavescente parum opaco et subglauco, sapore non adeo amaro, et odore minus fragrante; partim vero Balsamo ferro candenti immisso, quo odor proprius sese prodit; partim vero ex admixta Tinctura tartari vel alia alcalina, qua sincerus balsamus fere omnis solvitur limpidusque evadit. Oleum amygdalarum, balsamo in spiritu vini soluto, in fundo remanet.

BALSAMUM PERUVIANUM; BALSAMUM PERUVIANUM NIGRUM. Sort peruviansk Balsom. Schwarzer peruvianischer Balsam.

Myroxyli Peruiferi, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., SUCCUS oleoso resinosus arboris in America australi, maxime regno Peruviano crescentis, et e cortice, coctione in aqua, paratus. Albus enim, spontaneo exsudans stillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e spadiceo nigricans, crassitudinis melleae, ponderosus; saporis acris, aromatici, pinguiusculi, amaricantis; odoris suavis fragrantis, e Caryophyllaceo et balsami Tolutani, Benzoïni, Styracini et praesertim siliquae Vanillae odore quasi confusi, quem etiam dispergit carbonibus aut ferro ignito inspersus; opacus, inter digitos tractus fila subtilia pellucida exhibens; frigidae aquae guttatim instillatus fundum petens; bullienti vero in pelliculam oleosam penetrantis saporis, aquae innatantem et in partem graviorem crudiorem fundum petentem, dehiscens. Chartae instillata gutta nigra manens et adhaerens, probi; rubicunda vero prompteque defluens, factitii signum esse dicitur. Oleum, interveniente cera, cum balsamo commixtum Peruviano, patescit super lenem ignem, ubi quid

balsami sinceri inest, secedit et fundum petit. Conficitur etiam balsamus spurius ex populi gemmis cum oleo secundario Benzoës digestis, qui balsamus quidem veri odorem mentitur, sed minus suavis et validus est. Alii Benzoës partes quatuor, Styracis unam, cum oleo coquunt et Asphalto tingunt; quae fraus in Alcohole Vini facile detegitur, in quo balsamus verus omnis solvitur.

BARDANA, LAPPA MAJOR. Agerborre; Agerskreppe; Storskreppe; Tordenskreppe; Lungegraes-Klunger; Klaegg-Haarklaeggborrer; Borre. Kletten.

Arctii Lappae, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., RADIX perennis, ad vias et in locis ruderatis frequens, ramosa foris nigricans, intus alba, fibrosa, saporis subdulcis, subausteri: Majo mense colligenda. Rejiciatur vetusta lignosa. Flor. Dan. Tab. 642.

BARYTA SULPHURICA. Vid. *Spathum ponderosum*.

BDELLIUM. Bdelliumgummi. Gummi Bdellium.

Arboris incognitae aut nondum descriptae in Guinea, Arabia, Media et India nascentis LACRYMA; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concreta, sapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in cistis permistum reperitur. Praefertur amarum, pellucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

BECCABUNGA. Lemmike; Ledmye; Bekbung. Bachbungen; Wasserbungen; Bachbohnen.

Veronicae Beccabungae, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA RECENS. Caulis repens, cylindricus, glaber, succulentus, spithameus, subramosus, ramis oppositis. Folia ovata, obtusa, serrata, utrinque glabra. Odor contusorum foliorum debilis. Sapor amaricans acriusculus, substypticus. Ad scaturigines frequens. Flor. Dan. Tab. 511.

BELLADONNA; SOLANUM FURIOSUM. Natskade. Nachtschatten; Toollbeeren; Wolfskirschen.

Atropae Belladonnae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA. In hortis culta, Austriae et Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo, ne quid ejus aliis herbis admisceatur; saporis et odoris est fere oleracei. Proveniunt pariter in Falstria, et mense Junio colligantur. RADIX sublignosa, ramosa, geniculata, e cinereo flavescens. Flor. Dan. Tab. 758.

BENZOË; ASA DULCIS; GUMMI BENZOËS. Benzoë. Benzoë.

Styracis Benzoës, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., RESINA, ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis; odor fragrans gratusque, inprimis si accendatur; prunis impositum liquescens; inter dentes friabilis, in ore autem non solubilis; saporis subdulcis, resinosi et balsamici. Quo magis abundat

massulis albicantibus flavescentibus, amygdaloides tunc dicta, eo est praestantior. Rejiciatur fusca impura.

BERBERIS. Berberisbaer. Berberisbeeren.

Berberidis vulgaris, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., BACCAE. Frutex albescens ad sepes in sylvis crescens, inque hortis colitur. Baccae sunt coloris pulchre rubri, odoris expertes; saporis grate acidi, subadstringentis; pro gelatina aut syrupo colligendae. Flor. Dan. Tab. 904.

Earundem SUCCUS ruber, qui colatione clarior fit non tamen limpidus, et gratia succo citri aut Tamarindorum similis est, et postquam crystallorum forma sal essentiale tartari excussit, acidum tamen acre servat. Prelo e stanno puro confecto exprimatur, et per plures annos in ampullis, oleo olivarum superaddito servetur.

BERGAMOTTAE OLEUM; CORTICUM AURANTIORUM OLEUM. Bergamot-Olie. Bergamoth-Oel.

Citri medicae e specie Bergamotta dicta, expressione obtentum OLEUM essentiale ex Italia advectum, subpellucidum, flavescens, odoris et saporis corticum siccatorum.

BETULAE SUCCUS. Birkesaft. Birkenwasser.

Betulae albae, Linn. Cl. XXI. ord. Tetandr., LIQUOR, e vulnerato trunco aut ramis sponte stillans. Eliciatur verno tempore antequam frondeat

arbor, et studiose vitris inditus, superfuso pauxillo olei olivarum, contra aëris accessum defendatur.

Ejusdem CORTEX ab epidermide alba sericea liberatus, sit brunneus, subconvolutus, vix lineae crassitudinis, fragilis, fractura inaequali, non fibrosus; odoris debilis; saporis styptici subbalsamici.

BETULINUM OLEUM; OLEUM RUSCI; OLEUM BRUSCI. Birkeolie. Schwarzer Degen; Birkentheer.

Betulae albae e cortice exusto per descensum destillans OLEUM empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Russicum (Iuchten) redolens; quo odore dignoscitur a supposititio, e cortice Juniperi aliisque destillato.

BISMALVA. Vid. *Althea*.

BISMUTHUM; MARCASITA. Vismut. Wismuth.

Metallum perquam fragile, ex albo subrubicundum, lamellis compositum, leni igni admoto liquescens, fortiori vero in vase clauso avolans. Acido nitrico nuptum, per aquam sub forma oxydi albi praecipitatur.

BITUMEN JUDAICUM. Vid. *Asphaltum*.

BOLUS ARMENA. Armenisk Bolus. Armenischer Bolus.

Argillae pinguis species, coloris rubri vena lutea interstincti, durioris compagis ac communes terrae

bolares, prompte linguae adhaerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae et Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BORAX VENETA; CHRYSOCOLLA. Borax. Borax; Borras.

Borax; Tincal; Asiae sal nativum e Natro et acido boracico constans; peracta depuratione et crystallisatione nomine boracis insignitur. Eligatur borax alba, e parvis transparentibus massulis constans, in igne spumescens, facile fluens et vitrescens; saporis est lixiviosi.

BOVISTA; CREPITUS LUPI. Ulvefiis; Fiisop. Bovist.

Lycoperdon Bovista, Linn. Cl. XXIV. ord. Fung., sub cute externa membranacea parenchyma exhibens leve, spongiosum, admodum molle, pulverulentum. In campis ericetosis pullulat.

BRYONIA. Galdebaer; Hundebaer. Gichtrübe; Zaunrübe.

Bryoniae albae, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., RADIX fusiformis, pedalis et ultra, saepe ramosa, albido-pallens, transversaliter rugosa, carnosa, lactescens, decorticatione in taleolos transversos dissecta et sicca, pallida est annulata atque radiata. Odor nauseosus; sapor nauseosus, acriusculus, substypticus, recentis vero debilior. Flor. Dan. Tab. 813.

BUGLOSSUM. Vid. *Alkanna rubra*.

C

CACAO. Cacaobonner. Cacaobohnen; Chocoladefrucht.

Theobroma Cacao, Linn. Cl. XVIII. ord. Pentandr., FRUCTUS. Arbuscula in Americae meridionalis locis depressis umbrosis culta. Semina oleoso farinacea, e fusco nigricantia, seminibus Viciae Fabae similia. Odorem vix ullum habent; saporem gratum oleosum, leniter subadstringentem amaricantem.

CAJEPUT OLEUM. Cajaput-Olie. Cajaput-Oel.

Melaleucae Leucadendri, Linn. Cl. XVIII. ord. Polyandr., OLEUM essentiale pellucidum, coloris laete virentis, ex insulis Moluccis, Malabariae et Banda allatum. Odoris camphoracei cum aliqua odoris terebinthinacei miscela, minori copia valde grati; saporis aromatici, momento contactus, linguae sensum frigoris imprimentis.

CALAMINARIS LAPIS; CADMIA. Galmei. Gallmey.

Zinci minera terrea, coloris flavescentis vel fusci, circa Aquisgranum nec non in Anglia et Polonia e terra eruta. Praestat ruber.

CALAMUS AROMATICUS; ACORUS VERUS. Calmus. Calmus; Ackerwurzel.

Acori Calami, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RA-

DIX. Perennis, in paludosis et aquis stagnantibus luxurians; longa, obliqua, crebro geniculata, digitum crassa, ex flavo rufescens, intus alba et fungosa. Saporis acris et aromatici; odoris fragrantis.

CALX. Kalk. Kalch.

Paratur e lapidibus et terris calcareis, e conchis marinis et ostrearum calcinatis. Odor nullus; sapor causticus. E testis ostrearum paratus praefertur.

CAMPESCANUM s. CAMPESCENSE LIGNUM. Kampesketräet. Kampeschenholz.

Haematoxyli Campescani, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LIGNUM arboris in America calidiori, ad sinum Campesce regni Mexicani copiose crescentis, durum admodum et compactum, coloris rubri, odoris vix ullius; saporis dulcis amaricantis, leniter adstringentis.

CAMPHORA. Campher. Kampher.

Lauri camphoriferae aliusque arboris ignotae, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., CONCRETUM resinoso oleosum volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia et Java per Batavos allatum, et ab iisdem, nova uti videtur sublimatione ope calcis vivae per se exstinctae ac dilapsae, depuratum, et in panes seu massas orbiculares infra concavas, coactum. Odorem habet fragrantissimum, penetrantem, ad Rosmarinum accedentem; saporem calidissimum Menthae Piperitidis aemulum, amaricantem, linguam faucesque penetrantem. Optima nivea et glaciei instar est, subdiaphana; super ignem liquata olei in-

star fluit, et accensa deflagrat omnis. Quum ocyssime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

CANCRORUM LAPIDES. Krebstene; Krebsoine. Krebsteine; Krebsaugen.

Cancri Astaci Concrementa calcarea, e lamellis sibi superincumbentibus vel striis composita, ventriculo accreta, umbilicata, qua nota ab adulteratis dignoscuntur.

CANELLA ALBA. Hvid Kaneel. Weiszer. Zimmet.

Winteranae canellae, Linn. Cl. XI. ord. Monogyn., CORTEX. Arbor Indiae occidentalis in Jamaica frequens. Cortex in superficie externa passim vel ex albo flavescens, vel virescens, vel ex fusco rubens, subtus autem albicans. Saporis acriusculi et aromatici.

CANNABIS. Hamp. Hanf.

Cannabis sativae, Linn. Cl. XXI. ord. Pentandr., SEMEN. Planta annua colitur ubique in agris. Semina sunt rotunda glabra, oleoso mucilaginosa. Vix ullum odorem habent; saporem subfatuum.

CANTHARIDES. Spanske Fluer. Spanische Fliegen.

Meloë vesicatorius Linn. sive Lytta vesicatoria Fabricii, in regionibus calidioribus, Hispania, Gallia, Germania, etc. abundans; oblonga, e viridi splendens, antennis nigris filiformibus, mense Junio et

Julio, dum Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, quas praecipue amat, gregarie depascuit, colligatur et leviter siccetur. Praeferuntur minores, non ultra perpauca grana ponderantes, recentes, integrae non pulverulentae. Odor et sapor nauseosus teterrimus et piceus est.

CAOUTCHOU. Vid. *Resina elastica.*

CARDAMINES; NASTURTIUM PRATÉNSE. Engekasse; Vildkasse; Giogeblomster. Gauchblumen; Wiesenkresse.

Cardamines pratensis, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., HERBA RECENS et FLORES. Caulis erectus, subsimplex, glaber. Folia pinnata cum foliolis subrotundis, subcarnosa. Corolla cruciformis, petalis obovatis, retusis, albidis vel dilute violaceis; unguibus sublutescentibus, longitudinis calicis. Odor debilis; sapor subamarus, leviter acriusculus. In pascuis vere colligenda. Flor. Dan. Tab. 1039.

CARABE. Vid. *Succinum.*

CARDAMOMUM MINUS. Cardamommer. Kardamomen; Kleine Kardamomen.

Amomi Cardamomi, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., FOLLICULI ventricosi, triloculares, continentes semina angulata e subrufo fusca si recentia sint, quae praeferenda; temporis mora vero e cinereo ferruginea, multum aromatica, notabilis Camphorae odoris. Planta perennis palustris, Indiae orientalis.

Crotonis Cascarillae, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., vel *Clutiae Eluteriae*, Linn. Cl. XXII. ord. Gynandr., CORTEX ex America e calidis ejus regionibus allatus. Coloris extus cinerei, intus e ferrugineo fusci, quem etiam comminutus servat: fragilis. Odoris inprimis accensi, gratissime fragrantis; saporis amari multum aromatici. Praestat ponderosus, defractus particulis resinosis splendens, et si accensus fuerit fumum moschatum temulentum edens.

CASSIA FISTULA. Cassie. Kassia.

Cassiae Fistulae, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., SILIQUA arboris Arabiae et utriusque Indiae; nigricans, teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso nigro interne dissepimentis transversis interstincto, continens semina compressa, fulva, et pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a seminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. Indica, quae vere efficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam Alexandrina, vilior est Americana, in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta, pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa, aspera, crassior, pulpam fovet acidam magis, et nauseosam. Quidam e deteriore Cassiae specie pulpam melle syrupisque conditam extrahunt, sub floris Cassiae nomine, quae vero mora temporis mucorem et acredinem noxiam contrahit.

CASTOREUM. Bävergeel. Biebergeil.

Castoris, *Fiber dicti*, Linn. Cl. I. ord. Glires, FOLLICULI juxta anum et utrumque latus uretrae, prope praeputium haerentes, in quibus secernitur humor pinguis, oleaginosus, sebaceus. Inde exempti infumatione contra corruptionem defensi, substantiam fuscam siccam, sed non acidam (quae semper rejicienda est) continent. Aestumatur Dantiscanum, Prussicum, Polonicum, Germanicum, durum, ponderosum, rufum, in saccis majoribus ovi magnitudinem aequantibus, tenuibus membranulis intermixtum. Odoris penetrantis ingrati; saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae sed satis bonum est Castoreum Russicum, ut et Anglicum ex America septentrionali allatum, siccius, minus fortioris odoris, minoribus magisque nigris contentum sacculis, qui tunicae cellulosae tenaciori interjacent. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, Arenis, Melle; odore et sapore fraus detegitur.

CATAPUTIA MAJOR; RICINUS VULGARIS. Purgeerkorn. Purgierkörner; Wunderbaumsaamen.

Ricini communis, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, fabae minoris magnitudinis; coloris albi et cinerei, ex nigro variegati, sub putamine tenui nucleum condens album; saporis acris, urentis, quae acrimonia tamen haeret in putamine non autem in nucleo; odoris nullius. In hortis colitur, ac sponte in India utraque provenit. Ex seminibus a putamine purgatis, per expressionem, Oleum Ricini obtinetur.

CATECHU TERRA; CATECHU; TERRA JAPONICA. Iaponisk Iord. Catechu.

Arecae Catechu? Linn. e palmarum familia; *Pinanga* Rumphio dicta, vel *Mimosae Catechu*, Linn. Cl. XXIII. ord. Monoic., SUCCUS inspissatus, si ex drupis arboris primae speciei, vel extractum aquosum, si ex ligno sequentis speciei obtinetur. Utraque arbor copiose crescit in India orientali. Optimum Catechu sed rarum, coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum, lenissime adstringentis primum, deinde subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, intus pauxillum laetioris et cum splendore nitidi; saporis non ingrate adstringentis, totumque in ore deliquescit nullis relictis faecibus. Nigrum adustum, cum nidore ingrate sapidum et acerbum, recrementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

CENTAURIUM MINUS. Tusindgylden; Agerum. Tausendgülden.

Gentianae Centaurii, Linn. Cl. V. ord. Digyn., COMA florens in apricis praesertim maritimis proveniens, floribus rubentibus: odoris fere nullius; saporis amarissimi, mense Julio et Augusto colligenda. Flor. Dan. Tab. 617.

CEPA. Log. Zwiebeln.

Allii Cepae, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX bulbosa tunicata. Planta perennis in hortis culta. Odoris fragrantis, alliacei, graveolentis; saporis

subdulcescentis, acris Radix concissa oculos ferit volatili suo principio.

CERA: Vox. Wachs.

Apis melliferae e florum staminibus et nectariis collecta et elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis et in panes fusis, parata, sub Cerae flavae nomine: quae repetita ad ignem fusione purificata, lota, aëre, sale aliisque artificiis dealbata, Ceram albam exhibet.

CERASA ACIDA. Sure Kirsebär. Saure Kirschen.

Pruni Cerasi, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., FRUCTUS. Arbor in hortis frequentissima. Drupa rugosa, rubra, carne valde acida, succo sanguineo: odoris nullius; saporis dulcis acidi. Non modo ex recentibus, sed etiam e siccatis succus exprimitur. Cerasorum nuclei aquae destillandae inserviunt.

CERUSSA ALBA; PLUMBUM CARBONICUM. Bleghvidt. Bleyweis.

E plumbo vaporibus vegetabilium acidorum exposito, aut iisdem soluto, paratur. Sit ponderosa, alba et gustu dulcis. Habet lamellas friabiles, quae est sincerrima, et praefertur illae, quae sub forma panum conicorum charta involutorum prostat, quaeque dicitur Veneta vel Belgica. Odoris est cretacei et saporis adstringentis.

CETI SPERMA. Hvalraff. Wallrath.

Physeteris Macrocephali, Linn. Cl. I. ord. Ceti; e ventriculis cerebri Liquor unctuosus, coctione aridus redditus. Eligatur album dulce, recens, sebaceum, solidum, fragile, nitidum, lubricum, tenerum, mole quasi e parvis furfuraceis squamulis aggregata, in spiritu vini calido solubile, tactu pingue. Odorem habet debiliorem, piscinum, minus ingratum; saporem oleosum subdulcem non ingratum. Eligatur albissimum, tenue, semipellucidum, lubricum, in oleo facillime liquescens. Rejiciatur flavum, rancidi saporis et odoris, et cera adulteratum, quod lixivio caustico ad saponis speciem coctum, dein in aqua rursus solutum, ceram deponit insolubilem. In lagena clausa servandum, ne rancidum evadat.

CHAMOMILLA ROMANA. Romerske Cameelblomster. Römische Camillen.

Anthemidos nobilis, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., FLORES, sive simplices, sive pleni in hortis provenientes. Odoris fragrantis, balsamici, grati; saporis aromatico-amaricantis, calidiusculi.

CHAMOMILLA VULGARIS. Cameelblomster; Cameelblom; Munkekrone. Camillen.

Matricariae Chamomillae et suaveolentis, Linn. Cl. XXI. ord. Polygam. superfl., FLORES. Plantae annuae in agris cultis crescentes, mense Julio colligendi, qui a cotulae foetidae floribus dignoscuntur, tum odore, tum paleis setaceis in cotulae receptaculo reperiundis. Odor florum fragrans, gratus, fortis; sapor amarus calidiusculus.

CHAEREFOLIUM; CHEROPHYLLUM. Korvel. Kürbel; Kerbel.

Scandicis Cerefolii, Linn. Cl. V. ord. Digyn., HERBA annua in hortis, omni, qua fieri potest, tempestate colenda, sicca etiam servanda. Odor recentis gratus, balsamicus, debilis nisi fricetur; sapor balsamico-aromaticus ad foeniculum accedens.

CHELIDONIUM VULGARE MAJUS. Store Svaleurt; Selidon. Grosz Schellkraut.

Chelidonii majoris, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., RADIX perennis fibrosa, miniati coloris, succo croceo intensiori turgens. Planta perennis locis ruderatis, umbrosis et ad sepes copiosissima. Odoris graviusculi; saporis acris, subamaricantis, inhaerentis. Flor. Dan. Tab. 542.

Ejusdem HERBA recens cum radice.

CHINA PONDEROSA; CHINA. Chinarod. Chinawurzel.

Smilacis Chinae, Linn. Cl. XXII ord. Hexagyn., RADIX nodosa ex Indiis advecta, ponderosa, solida, firma, difficulter scissilis, pallide rubens, tentata digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo sensu afficiens; praefertur occidentali seu Americanae, quae coloris est obscurioris et medullae spongiosioris ponderisque minoris. Haec uti et radices cariosae, quorum foramina rubris terris bolaribus vel Lithargyrio replentur, merito ex materia pharmaceutica excluduntur.

CINERES CLAVELLATI seu KALI CARBONATUM CRUDUM. Potaske. Potasche.

Est Sal alcalinum vegetabile, fixum impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis inprimis paratum, Kali sulphurico, Kali muriatico et partibus terreis inquinatum. Quare nova in aqua frigida solutione, filtratione et exsiccatione, ad Kali purum obtinendum indiget. Germanici cineres, quo puriores sunt, magisque albentes levesque (Perlasche vocant) eo purius largiuntur Kali. Ad mechanicos vero usus praestant cineres Russici, in massis grandibus duris, obscurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus allati, ob interpolata inter cremandum segmenta abiegena, acido vegetabili scatentes, et re vera diversum a vero Kali sal exhibentes. Odorem habet nûllum, saporem lixiviosum. De Kali carbonico depurato inter praeparata suo loco dicetur.

CITRULLUS. Angurier; Vandmeloner. Angurien; Wassermelonen.

Cucurbitae citrulli, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., in hortis cultae, SEMEN recens non rancidum. Cucurbitinis sunt similia, nisi quod extus sint atra.

CITRUM. Citron. Citrone.

Citri medicae, Linn. Cl. XVIII. ord. Icosandr., MALUM; ex quo caro seu pulpa. Arbor in Media et Persia spontanea est, copiose crescit in Italia, Hispania et Lusitania. Eligantur majores, cortice te-

nui vestiti et ponderosiores, recens siccati cortices citrini, non virides, nec fusci vel situ corrupti. Odor flavedinis recentis fragrans, gratissimus; sapor aromaticus calidiusculus, subamarus. Succus intense acidus purus.

Eorundem SUCCUS recens expressus. Saporis acidi grati; cum Kali puro saturatus succus citri, terram praecipitat calcaream, in majori quantitate succi citri iterum solubilem, qua indole ab omnibus aliis acidis distinguendus. Aceto adulteratus, saturatione cum Kali in sal neutrum mutatus, ex instillatione aliquot guttularum, acidi sulphurici odorem spargit aceti; Kali sulphuricum praecipitatur, si acidi sulphurici, Kali tartaricum vero, si acidi tartarici et aliquid admixtum fuerit; sal neutrum e liquoris evaporatione obtentum prunis superpositum, detonando acidum nitricum enunciat; solutum vero si argento nitrico praecipitetur, acidum muriaticum prodit. Genuini et fortis succi citri drachmae duodecim Kali drachma una perfecte saturantur. Methodum acidum citri purum ac crystallisatum praeparandi vide inter praeparata. Exprimitur succus in officinis ipsis, plerumque vero e locis, quae citris abundant, v. c. ex Sicilia et ex India transmittitur. Corruptelae valde obnoxius est, quam ad praecavendam, succus per chartam bibulam filtratus, in vasis vitreis longi et angusti colli probe repletis et arte clausis, in cella servetur; adhaerescens vere per moram suberi cuticula, sedulo et caute separetur, ab omni agitatione ne sedimentum ascendat, solicite caveatur.

Eorundem CORTICES in usum trahuntur tam

recentes quam siccati, amborum vero solummodo exterior flava pars, ab interna fungosa alba liberata, quae in pharmacopoliis sub nomine Flavedinis corticum citri asservatur. Cortices citri siccati et in frusta dissecati ovato-acuminata, extus coloris profunde lutei, intus substantia fungosa albicante adhuc inducti, plerumque ex Italia et Sicilia afferuntur, fragrantia recentiorum et sapore aromatico privati. Eligantur saporis subamari calidi, nec obsoleti nec situ corrupti.

Eorundem e fructibus OLEUM ESSENTIALE, expressione aut stillatione; aut extemporaneo affrictu Sacchari albi paratum, Essentia seu *oleum de Cedro* dictum; sit flavum pellucidum, graveolens non turbidum.

CLAVELLI CINNAMOMI. Vid. *Cinnamomum.*

COCCINELLA. Carmosinorm; Cuzzinel. Kochenille.

Coccus Cacti, in Cacto coccinellifero collecta Insecta, certa Encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania et regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia, trita vero purpurea, ponderosa. Saporis sunt acris, amaricantis, adstringentis.

COCHLEARIA. Skeeurt; Strandskeeurt; Skiorbugsurt; Cochlearia; Finmarkekaal; Stort Eriksgräs. Löffelkraut.

Cochlearia officinalis, Linn. Cl. XIV. ord. Silicul., HERBA annua, ad littora maritima Europae

borealis frequens, quoque in hortis culta. Herba florens, principio acri volatili praedita. Odor subnasturcinus, debilis; sapor americans, os et fauces mordens. Flor. Dan. Tab. 135.

COLCHICUM AUTUMNALE. Nogne Jomfrue. Zeitlose; Lustblumen.

Colchici autumnalis, Linn. Cl. VI. ord. Trigyn., RADIX substantiae geminae, tuberosa carnosa, quarum una exterior sterilis est et marcescens, altera intra priorem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus reperitur. Odor recentis tempore aestivo hircinus; sapor acris.

COLLA PISCIUM. Vid. *Ichthyocolla*.

COLOCYNTIDES. Coloqvinder. Coloquinten.

Cucumeris Colocynthidis, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., POMA ex Oriente allata, candida, levia, fungosa, peramara, integra, acriuscula; odoris debilis nauseosi, cortice duro ex albo luteo cincta.

COLOPHONIUM. Vid. *Terebinthina*.

COLUMBO. Columbo. Columbo.

Columbae seu Columbo RADIX. Habitat in continenti Asiae versus Ceilonam. Odor frictae radicis aromaticus est; sapor ingrate amarus, modice pungens.

CORIANDRUM. Coriander. Coriander.

Coriandri sativi, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SE-

MEN, recens rotundum, ponderosum; odoris grati quando jam sicca sunt; saporis perinde grati aromatici. Rejiciatur leve, pulverulentum, e vermiculis exesum. Planta Italiae inquilina in hortis colitur.

CORNU CERVI. Hiortetakke. Hirschhorn.

Cervi Elephas cornu.

CORTEX CARIBAEUS. Caraibisk Chinabark. Caraibische Rinde; Jamaicanische China.

Cinchonae Caribaeae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., CORTEX in frustis varie magnitudinis et crassitiei ex insulis Caribaeis allatus; optimus convolutus, crassitudine unguis, externe cinereo-olivaceus, Lichenibus cinereo-albidis maculatus, interne laevis, rubro vel fusco-brunneus, fractura laevis. Odor debilis; sapor amarus, acris, subnauseosus.

CORTEX PERUVIANUS; CHINCHINAE CORTEX. Kina, Kinabark. Chinarinde; Fieberrinde.

Cinchonae officinalis, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., CORTEX ex America australi advectus. Variae dantur species: e rubro ferruginea (Cascarilla colorata): e Cinnamomeo rufa (Cascarilla amaryl-la): alba, crassa, fungosa (Cascarilla blanca): externe denique alba, intus cinnamomea, quae vilissima species frigidiori sub coelo germinat (Cascarilla crispilla). Utraeque priores adhibeantur, rejiciantur vero duae posteriores. In selectu autem cautissime versandum est. Sapor sit amarus cum adstrictione

aliqua diu linguae inhaerente, inprimis vero sapore suo specifico mucido se distinguat; non sit parum sapidus, neque saporis viscidi; neque impense stypticus et nauseose amarus, uti occurrit in specie viliore, aliarum arborum corticibus remixta, et subinde Aloës solutione imbuta. Odor sit paulum aromaticus, specifice mucidus, quem notabilem exhibet affusa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus sit, neque putridus nauseosus odor, quem spargit haud rite siccatus, aut in navi madefactus et corruptus cortex. Tenuis sit, certe crassitudinis mediae, gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis sit facies externa et quasi polita, sed scabra, subfusca, et Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti corticis color, neque pallide flava, qui Blancae et Crispillae esse solet; neque laete rutilans, cujusmodi de aliis arboribus deglubitur. Internus color sit pauxillum Cinnammo obscurior, magisque obsoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax sit aut fungosus, neque in fibras lignosas decerptus, aut in farinam cariosam dehiscens; sed compactus sit, aequaliter fragilis, et ad solem moleculis micantibus resplendeat. Decoctum corticis aquosum adhuc calidum, vitro inditum rufescat, frigefactum verum pallescat. Lignum cortici forte adhaerens studiose separandum est. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admixtas particulas lignosas fibrosas pilorum instar, suspectus rejiciatur.

CORTEX PERUVIANUS FLAVUS; CORTEX PERUVIANUS REGIUS; CORTEX CHINCHINAE FLAVUS s. REGIUS. Guul Chinabark; Kongens Chinabark. Gelbe Chinarinde; Konigs-Chinarinde.

Cortex Cinchonae, speciei nondum satis definitae. Cortex ex eadem regione ut prior allatus, crassior et magis lignosus, qui colore cinnamomeo et principio amaro subaromatico, omnibus aliis Cinchonae corticibus antecellit.

CORTEX PERUVIANUS RUBER; CORTEX CHINCHINAE RUBRAE. Rod Chinabark. Rothe Chinarinde.

Ex truncis et ramis crassioribus ejusdem arboris, quae corticem vulgarem erogat, detrahitur. Saporis est magis adstringentis ac aliae species. Principio resinoso et adstringente prae caeteris Cinchonae corticibus eminet.

CREMOR TARTARI. Vid. *Tartarus vini.*

CREPITUS LUPI. Vid. *Bovista.*

CRETA ALBA. Hvid Kride. Weisse Kreide.

Terra macra, Linn. Cl. III. ord. Fossil., alcalina, in Siaelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, heterogeneis libera, ex insula Moen adfertur. Odore gaudet nullo; sapore terreo.

CROCUS. Safran. Saffran.

Croci sativi officinalis, *varietas autumnalis*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., PISTILLORUM STIGMATA. Praestat Crocus Anglicus in massas orbiculares pressione coactus, itemque Hispanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia Gastinois, aut Austriacus ad nos pervenit. Sit coloris aurantii, recens, neque marcidus tactu neque humidus; sed tenax, mollis, pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, sequax, ejusdem intus ac extus coloris: saporis amariusculi; odoris gravis, circumquaque se defundentis, insignis ratione voluminis levitatis. Adulteratur imprimis gallicus, flore Carthami tinctorii, qui colore dilutius luteo facile dignoscitur. Qui mucidi odoris est, rejiciatur.

CRYSTALLI TARTARI. Vid. *Tartarus vini.*

CUBEBAE. Cubeber. Cubeben; Schwindelkörner.

Piperis caudati Berg., Linn. Cl. II. ord. Trigyn., FRUCTUS. Baccae subrotundae, fuscae, plicis elevatis, reticulatae, magnitudinis seminis Pisi, pedunculatae; parenchymate albido, oleoso. Odor fragrans; sapor aromaticus, acris, dein in ore et faucibus calidus. Ex Java et aliis regionibus Indiae orientalis adfertur.

CUCUMIS. Agurk. Gurke.

Cucumeris sativi, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., FRUCTUS. Pomum viride, cylindricum vel ova-

tum, subincurvum, torulosum: toribus inaequalibus subaculeatis. Parenchyma carnoso-succulentum, albido-virescens. SEMINA MATURA ovato-oblonga utrinque obtusa, compressa albido-pallescentia. Odor pomi crudi subfatuus proprius, seminum nullus. Sapor pomi, odori congruus, subdulcescens, seminum amygdalinus.

CUPRUM; AES. Kobber. Kupfer.

Est purum ex solutione cupri sulphurici obtentum. Odorem habet proprium, si manu teratur; saporem metallicum valde nauseosum, vix ex ore vel lingua delendum; acido carbonico in oxydum viride mutatur.

CUPRUM ACETICUM. Vid. *Aerugo.*

CUPRUM SULPHURICUM. Vid. *Vitriolum coeruleum.*

CURCUMA. Gurkemeje. Curcumei; Gelber Ingwer.

Amomum Curcumae Jacq., Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX orientalis, extus lutea, intus e luteo rufa, dura, densa, ponderosa, defracta particulas resinosas micantes exhibens; saporis amaricantis leviter aromatici, odoris fere nullius.

CYDONIA. Qvaeder. Quitten.

Pyri Cydoniae, Linn. Cl. XII. ord. Pentagyn., SEMINA ex arbore Cretensi in hortis culti. Sunt

oblongo-acuta et spadiceo-fusca, et quo magis nitida sunt, eo meliora habentur. Multa mucilagine cincta sunt. Rejiciantur vetusta, nigra, sordida.

CYNARA. Artiskok. Artischocken.

Cynarae Scolymi, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., HERBA RECENS. Folia subspinosa pinnata vel indivisa; odoris debilis, saporis amari. In hortis colitur et tempore vernali aestivalique colligenda.

CYNOSBATA. Hyben; Nyper. Hanbutten.

Rosae caninae, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FRUCTUS ovatus, obtusus, coronatus, maguitudine glandis quercinae vel ultra, coccineus, intus cavus, seminibus pallidis lanato-hispidis repletus; odoris nullius, saporis aciduli. Frutex in dumetis et apricis ubique proveniens. Flor. Dan. Tab. 555.

D

DAUCUS VULGARIS s. SATIVUS. Gulerod. Carotten; Gelbe Wurzeln; Möhren.

Dauci Carotae, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX fusiformis, crassa, aurantia vel ex flavo rubens, succo grate dulci repleta; in agris hortisque colitur. In cellis sabulo humido servanda. Flor. Dan. Tab. 723.

DATURA STRAMMONIUM. Galurt. Stechapfel; Tollkraut; Stachelnuszkraut.

Daturae Strammonii, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA magna saturate viridia, odoris virosi.

Annua, in ruderatis ad sepes, ad vias, ad fossas spontanea, etiam in hortis culta. Flor. Dan. Tab. 436.

DENS LEONIS. Vid. *Taraxacum*.

DIGITALIS PURPUREA. **Rod Fingerhat. Rother Fingerhut.**

Digitalis purpureae, Linn. Cl. XIV. ord. Angyosp., FOLIA. Planta biennis in campis apricis australibus crescit. Ut quoque in Norvegiae provinciis, Christiansandia et in Bergensi. Odore gaudet nullo; sapore autem amaro, ingrato, acri. Brevi ante florescentiam colligenda. Flor. Dan. Tab. 74.

DULCAMARA. **Bittersode; Hundebaer; Troldbaer; Kniplyng. Bittersüsz; Alfranken.**

Solani Dulcamarae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., STIPITES. Ad fossas et in locis paludosis habitat. Ramuli biennes vel triennes longi, calamum crassi, lignei, medullosi, cortice ex flavo viridescente, vel e cinereo fusco tecti; odoris, si recentes sint, gravis, nauseosi; saporis amaricantis postea subdulcescentis. Odor siccorum stipitum nullus; sapor magis amarus. Flor. Dan. Tab. 607.

E

ELECTRUM. Vid. *Succinum*.

ELEMI. **Elemi; Wildes Oelbaumgummi.**

Amyridis Elemiferae, Linn. Cl. VIII. ord. Mo-

nogyn., RESINA. Celebratum olim Elemi aethiopicum, coloris ex albo lutei et languido viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle, odoris Foeniculi, arundine involutum, non nisi rarissime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis, Elemi vulgare Amyridis, modo probum sit, ejusdem ac aethiopicum coloris, semipellucidum flavescens, fere instar cerae cum immixta viridine, inter digitos frigidos friabilis, calefactum vero tenax et sequax, calore lentescens; odoris subvinosi ad acetum accedentis fragrantis; saporis gravis amaricantis. Rejiciatur fuscum, cinereum. Sunt qui resinam flavam cum oleo Spicae et Terebinthinae commiscent, indeque Elemi artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Terebinthinae patescit, detegitur. E factitio Elemi paratum unguentum Arcaei, mox in superficie contrahit pelliculam aridam duriusculam, gilvam: probum vero Elemi cum reliquis aequabiliter commissum manet. Non pro vero sed spurio Elemi habendum est Elemi Surinamense, ex arbore a Breynio descripta; quare illa Resina, Gummi Chibou nonnullis appellatur. Eligatur odoratum, purum, pingue. Arbor Americae meridionalis.

Resina Elemi orientalis, quae in lacrymis luteo virescentibus, diaphanis, odoris grati foeniculacei, e cortice trunci Amyridis Zeilonicae Retz sponte destillat, melior est et efficacior.

ELEUTHERIUM. Vid. *Cascarilla*.

ENULA; HELENIUM. Alandsrod; Sanct-Ellensrod. Alandwurzel.

Inulae Helenii, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., planta perennis. RADIX biennis, crassa, carnosa, multifida, extus fusca, intus alba, odoris subaromatici violacei; saporis amari aromatici pungentis. In locis humidis, paludosis reperiunda, quae efficacior. Flor. Dan. Tab. 728.

ERUCA. Hvid Sennep. Weiszer Senf.

Brassicae Erucae seu *Sinapis albae*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., plantae annuae in hortis cultae SEMEN rotundum, parvum, flavescens; odoris graviusculi; saporis acris et seminibus Sinapis nigrae similis, sed longe remissioris.

EUPHORBIUM. Euphorbiumgummi. Scharfes Euphorbium-Gummi.

Euphorbiae officinalis, Linn. Cl. XI. ord. Trigyn., GUMMI RESINA. Concreta in guttas vel lacrymas ex pallido flavescentes, haud coloris aurei, splendidas, modo rotundas, modo oblongas ramosas et cavernosas. Odoris haud ingrati dum prunis injicitur; saporis acerrimi, urentis, nauseosi. Affertur ex Africae regionibus.

F

FAGUS. Bog. Buchen.

Fagi sylvestris, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., FRUCTUS, compositus e nucibus duabus, argute triquetris, rufo-badiis, unilocularibus, involucro quadrivalvi extus hispido inclusis. Semina triquetra, pallida; odoris nullius; saporis vix dulcescentis, subadstringentis. Arbor procerus in sylvis frequenter reperitur.

FARFARA; TUSSILAGO. Hestehov; Follefod; Hovblad; Hovurterod; Skreppe; Leerskreppe; Leerfivel. Brandlettich; Huflattich.

Tussilaginis Farfarae, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., FOLIA, in humidis provenientia, non adeo adulta, Majo mense colligenda. Flor. Dan. Tab. 595.

Ejusdem RADIX teres, longa, ramosa, fibrillosa, pallida. Odor vix ullus; sapor substypticus leniter amaricans. Primo vere ante deflorescentiam colligenda.

FEL TAURI. Oxegalde. Ochsengalle.

Bovis tauri domestici cystica, viscosa, BILIS, ex flavo viridis; odoris ingrati; saporis peramari; in putredinem prona, statim inspissanda et in vitro clauso servanda.

FERRUM. Iern. Eisen.

Ferrum selectum, e cinereo nigrescens Metallum, Magneti obediens, quod acidis solutum, adstringente principio adhibito, nigricans praecipitatur. Odoris et saporis est proprii adstringentis.

FERRUM SULPHURICUM. Vid. *Vitriolum martis*.

FILIX. Bregne; Heedbregne; Skiaerbregne; Grofte Molfoor; Molfoorblom; Klojaeske; Bujaeske; Skorv; Hanblom; Rysteblom; Trepeek; Cassa Gaiske. Farnkraut.

Polypodii filicis maris, Linn. Cl. XXIV. ord. Filic., RADIX perennis, crassa ramosa, fortis squamosa badio-nigricans, intus pallida. Odoris dum recens est subnauseosi; saporis primum subdulcis, deinde amariusculi, subadstringentis. Autumno colligenda.

FLAMMULA JOVIS; CLEMATIS ERECTA. Braendeurt. Brennkraut.

Clematidis erectae. Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., FOLIA pinnata, foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis; odoris recentium debilis; saporis acris fauces linguamque urentis, diutius retenti eam rubefacientis, vesiculas eycitantis et exulcerantis; siccorum vero mitioris, acido-subdulcis, leniter adstringentis, parum stimulantis. In Germania meridionali reperitur.

Ejusdem FLORES. Sapor constanter acris est.

FLAVEDO CORTICUM CITRI. Vid. *Citrium*.

FLORES ANTHOS. Vid. *Rosmarinus*.

FLORES NAPHAE. Vid. *Aurantia*.

FOENICULUM. Fennikel. Fenchel.

Anethi Foeniculi, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis, digitalis, recta, alba; odoris grati, saporis subdulcis, aromatici. In hortis colitur; pars corticosa in usum vocatur.

Ejusdem SEMEN ponderosum, oblongum, subviride, striis semieminentibus spadiceo albicantibus

aut pallide flavescentibus distinctum. Oleo dives, grati odoris, calidiusculi et dulcescentis saporis.

FOENICULUM AQUATICUM. Vid. *Phellandrium*.

FOENUM GRAECUM; FOENU GRAECUM. Bukkehorn; Faenugraec. Bockshorn.

Trigonellae Foenugraeci, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., SEMINA quadrangularia vel rhombea, subplana, utrinque sulcata, vitellina; odoris fortis ingrati, saporis mucilaginosi, ex Europa australi advecta.

FORMICA. Myrer. Ameisen.

Formicae rufae, Linn. Cl. V. ord. Hymenopt. In campis et silvis frequentissimae. Insectum hymenopterum, acido volatili proprio praeditum.

FRAXINUS. Ask. Eschenbaum.

Fraxini excelsioris, Linn. Cl. XXIII. ord. Dioec., CORTEX, e cinereo pallescens ad viriditatem inclinans. Odoris nullius; saporis acris, amari, adstringentis. Flor. Dan. Tab. 969.

FUMARIA. Iordrog; Aakersissel. Erdrauch; Taubenkropf.

Fumariae officinalis, Linn. Cl. XVII. ord. Hexandr., PLANTA, recens in agris reperiunda, mense Majo colligenda. Inter segetes frequens est. Odorem habet nullum, sed saporem peramarum, salinum, ingratum. Flor. Dan. Tab. 940.

FUNGUS QUERCINUS. Vid. *Agaricus chirurgorum.*

G

GALANGA MINOR. Galange. Galgant.

Marantae Galangae, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX tuberosa, nodosa, geniculata, dura, minimum digitum crassa; seligantur ponderosae non cariosae, extus e spadiceo rubrae, intus rubellae; odoris, praesertim dum contundantur fragrantis, aromatici; saporis fervidi acris, subamari, subadstringentis. Ex Oriente advehuntur.

GALBANUM. Galbanum. Galbanum.

Bubonis Galbani, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI RESINA e Syria advecta, recens ex albo lutea; vetustior e luteo subrufa, ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, siccum quidem, sed calore manus lentescens et ductile, intense et nauseose specifice olidum; saporis calidi, amaricantis. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quisquiliis interpolatum. Neque tamen, quod in massis ad nos pervenit rejiciendum est, modo copiosas particulas albicantes parum splendentes, spiritum vini aureo colore tingentes, contineat. Abjiciatur vero impurum coloris luridi, fusci, crassitudinis cereae. Adulteratur variis vilioribus resinis, Ammoniaco aut Gummi subrufo Ferulae galbaniferae, quae in Sicilia crescit, variisque ramentis vegetabilium, quod e debiliore odore et defectu splendoris, colorisque variegati patescit.

GALLA. Galaebler. Galläpfel.

Quercus Cerris, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., a puncturis Cynipis querci natae EXCRESCENTIAE fungosae, globosae, ex albo flavescentes vel cinereae, saepe foramine parvo perforatae, tuberculatae, principio adstringente repletae. Praeferendae ex Aleppo allatae, coloris nigro-caerulescentis et imperforatae.

GAMBOGIA. Vid. *Gummi Guttae.*

GENTIANA RUBRA. Sode; Sodrod; Sodkonge; Skiaersode. Rother Enzian.

Gentianae purpureae, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis, longa, pollicem unum aut alterum crassa, extus fusca, intus e flavo rufescens, odoris debilis, saporis intense amari, in Norvagiae Alpibus habitans, quae luteae praeferenda. Flor. Dan. Tab. 50.

GEOFFROYA JAMAICENSIS. Jamaikansk Ormbarktraee. Jamaicanischer Wurmrindenbaum.

Geoffroyae inermis, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., CORTEX, ex Jamaica et aliis insulis Caribaeis advectus, extus cinereus vel ferrugineus, intus nigricans, fibrosus, tenax, sectione transversali minus splendens. Odor praesertim recentis nauseosus; sapor amaricans, subausterus.

GEOFFROYA SURINAMENSIS. Surinamsk Ormbarktraee. Surinamischer Wurmrindenbaum.

Geffroyae Surinamensis, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., CORTEX, in frustis longis, planis, crassitiei diversae pro arboris aetate, vel parte a qua separatus fuit. Genuinus CORTEX extus lichenibus cinereis ablatis, purpureo-fuscus, intus atro-purpureus vel variegatus, vel punctis albicantibus inspersus, filamentoso lamellosus, sectione transversali splendens et punctulatus. Odor sicci fere nullus, recentis vero nauseosus; sapor leviter amaricans, subausterus. E Surinamia adfertur.

GEUM URBANUM. Vid. *Caryophyllata*.

GLYCYRRHIZA, LIQUIRITIA. Lakrits. Süszholz. Liquiritien.

Glycyrrhizae glabrae s. *echinatae*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., RADIX ramosa, late serpens, perennis. Sit recens, tenax, flexilis, dissecta laete flava; odoris debilis, dulcis gratique saporis; sed coctione ingrate amarescens. Ex Franconia plerumque adfertur.

GRAMEN CANINUM. Hundegraes; Kroppegraes; Knaeegraes; Taggraes; Taegraes; Axrod; Axing; Skingraes; Qvikketaaen; Qvikurt. Queck; Graswurzel.

Tritici repentis, Linn. Cl. III. ord. Digyn., RADIX perennis, repens, geniculata, e sarmentis tenuibus constans. Pestis est vulgaris agrorum et hortorum. Odorem habet frumentaceum; saporem debiliter dulcescentem. Verno et autumnali, non aestivo, tempore colligatur. Flor. Dan. Tab. 748.

GRANATORUM CORTICES; MALICORIUM. Granataebleskal. Granatäpfelschaale.

Punicae Granati, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., cortices fructuum, externe e fusco rubicundi, interne flavi, crassi, coriacei, tenaces; saporis amaro-austeri, adstringentis. Ex Europa meridionali advecti.

GRATIOLA. Gudsnaadeurt. Gottesgnadenkraut.

Gratiolae officinalis, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA, quotannis recens ac florens colligenda, in uliginosis et humidis crescens; saporis peramari, acris. Flor. Dan Tab. 363.

Ejusdem RADIX cylindrica geniculata, extus pallide cinerascens, intus pallide lutescens; odoris debilis haud ingrati; saporis intense amari, nauseosi, inhaerentis.

GUAJACUM; LIGNUM SANCTUM. Pokkenholt; Guajak. Franzosenholz.

Guajaci officinalis, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LIGNUM et CORTEX. Illud extus fulvum, intus obsolete viride; hic e cinereo fuscus et viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis est ponderosum et resinosum, eo melius est. Saporis sit amari, subacris, parum aromatici. Carbonibus injectum non ingratum spargat et aromaticum odorem. Subsidat in aqua. Quod coloris dilutioris est, exsoletum et vetustum habeatur. Adfertur e nova Hispania et insulis Americanis.

Ejusdem e ligno RESINA ex America allata, fragilis, friabilis, subpellucida; saporis acris pungentis; odoris nullius, grati vero si prunis injiciatur. Coloris externe e viride pulli aut obscure rufi, interne albicantis subrubelli. Adulteratur additione aut Balsami Sulphuris Smalcaldici. Fraus detegitur facile super ignem, qui Sulphuris odorem extricat. Distinguenda est Resina, quae mediante spiritu vini e ligno extrahitur; haec vero nativa est, et ex arbore, quae Guajacum lignum suppeditat, exsudat. Eligatur illa, quae in minoribus frustis advehitur et corticibus adhaeret Guajaci. Quae soluta in spiritu vini, si instilletur spiritus nitri dulcis, coeruleo colore tingitur, sincera esse concluditur.

GUMMI ADSTRINGENS FOTHERGILLI. Vid. *Gummi Kino.*

GUMMI ARABICUM; GUMMI SENEGAL. Arabisk Gummi. Arabisch Gummi.

Mimosae Niloticae, Linn. Cl. XXIII. ord. Monoec., GUMMI, e Guinea et ore Nigritarum in frustis conspicuae molis, foris asperis allatum, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis prostat loco Gummi arabici (mimosae sive acaciae Aegyptiacae et Arabicae) pallide lutei, fragilis, fracti splendentis, pellucidi. Odorem et saporem nullum habet. Bdellii frustula, Senegal Gummi nonnunquam interpolata, odore se produnt.

GUMMI GAMBIENSE. Vid. *Gummi Kino.*

GUMMI GUTTAE, GUTTA GAMBA; GAMBOGIA. Gummigut. Gummigutt.

Stalagmitis Cambogioides Muray, GUMMI RESINA, e regno Chinae et Siam, ut et Ceylone allata, in officina forma placentarum largarum prostat, opaca, nitens, friabilis. Coloris e flavo rufi, aurantii, extus multo osbcurioris, humectata in pallidam flavedinem abiens. Odorem et saporem habet initio nullum, verum deinde acris fit cum siccitatis faucium sensu. Rejiciatur impura sordida nigricans.

GUMMI GUTTA GAMBA. Vid. *Gummi Guttae.*

GUMMI KINO s. GAMBIENSE s. RUBRUM ADSTRINGENS s. ADSTRINGENS FOTHERGILLI.

Arboris Africae interioris adhuc ignotae, massa gummi-resinosa, rubro nigricans, friabilis, opaca, fractura granulosa nitente, in aqua subsolubilis, reliqua in spiritu vini. Odor nullus; sapor adstringens.

GUMMI RUBRUM ADSTRINGENS. Vid. *Gummi Kino.*

GUMMI SENEGAL. Vid. *Gummi Arabicum.*

H

HELENIUM. Vid. *Enula.*

HELLEBORUS NIGER; MELAMPODIUM. Sort Nyserod. Christwurzel; Schwarze Nieswurzel.

Hellebori nigri, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., RADIX fibrosa, maximam partem in Laalandia, insula Moen, Germaniae australis et Helvetiae alpibus collecta. Probe radicis caput tuberosum, nigrum, nucem Moschatam aequat et sulcatum est. Fibrae sint extus tenues, laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nauseosus sit, acer et amaricans cum odore nauseoso; rejiciantur radices vetustae, fragiles, pulverulentae.

HELMINTHOCHORTUM. Strandmos. Korallenmoos; Murmmoos.

Confervae dichotomae, Linn. Cl. XXIV. ord. Alg. In mari circa Corsicam colligitur. Est subfusca, dichotoma; odore marino et nauseoso; sapore subsalso, nauseosoque praedita.

HIPPOCASTANUM. Hestecastanier; Vilde Castanier. Roszcastanien.

Aeschyli Hippocastani, Linn. Cl. VII. ord. Monogyn., CORTEX. Arbor ubique fere frequens est. Cortex ramorum saporem habet adstringentem, grate amarum, odorem nullum, colorem subluteum, albugine vero adhaerente liberandus est. Colligatur ex ramis aestate non nimis provectis, nec nimis teneris.

HIRUDO. Blodigle. Blutigel.

Hirudo medicinalis, depressa fusca, lineis longitudinalibus flavis dorsalibus sex, intermediis maculatis, subtus cinerea, nigro maculata.

HIRUNDINARIA; VINCETÒXICUM. Svalerod. Schwalbenwurzel; Gisrwurzel.

Asclepiadis Vinçetoxici, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis tuberosa fibrosa, in sabulosis et montosis reperiunda; subacris fervidique saporis et validi nardini subaromatici odoris. Flor. Dan. Tab. 849.

HYDRARGYRUM. Vid. *Mercurius.*

HYOSCYAMUS. Faudensnosser; Fandenspunge, Honsebanc; Bulmeurt; Horsetänder; Sodbonne; Bilsenkraut.

Hyoscyami nigri, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., HERBA in ruderatis pinguibus proveniens: mense Julio colligenda. Odor herbae recentis, narcoticus, ingratus; contusae tabacinus, sapor fatuus.

Ejusdem Semen exiguum subcinereum, subrotundum rugosum, compressum.

HYPERICON. Perikum; Hyperikum; Jordhulme; Blodblomater; Sanct-Hansurt; Mandeblod; Apothekerperikum, Johanniskraut.

Hyperici perforati, Linn. Cl. XVIII. ord. Pentandr. COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos sese explicuerit, mensibus Junio et Julio decerpenda; sapore subacri, balsamico, subadstringente, et odore suavi praedita. Quod ejus loco non raro substituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo, dignoscitur. Flor. Dan. Tab. 1043.

HYSSOPUS. Isop. Isop.

Hyssopi officinalis, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., COMA florida. Odorem habet sicca et recens fragrantem, saporem calidiusculum aromaticum, amaricantem.

I

JALAPPA. Jalap. Jalappe.

Convolvuli Jalappae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX vel potius taleoli radicis zonulis cincti, externe e lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix sit compacta, dura, ponderosa, igni admota inflammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Odoris est, cum in pulverem teritur, nauseosi; saporem habet acriusculum, diutius inhaerentem, ingratum. Admista Bryoniae segmenta, colore albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

JASMINI OLEUM. Jasminolie. Jasminöl.

Jasmini officinalis, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., florum OLEUM infusum, aliunde ad nos perveniens.

ICHTHYOCOLLA, s. COLLA PISCIUM. Huusblas. Hausenblase.

Acipenseris Sturionis, *Hussonis*, *stellati*, *aliarumque specierum* hujus generis GLUTEN, ex vesica aërea praecipue, nec non ex intestinis coctione extractum, refrigerio in pelliculas condensatum, et deinde in varias figuras convolutum et siccatum.

Optima in frustis albidis, subdiaphanis, solidis, ponderosis, in aqua facile ac perfecte solubilibus, et maximam partem ex Moscovia advectis habetur.

IPECACUANHA. Amerikansk Bräkrob. Amerikanische Brechwurzel; Ruhrwurzel.

Psychotriae emeticae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX repens, nodosa, geniculata: Brasiliensis, fusca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant radices, aut coloris gilvi sunt, spongiosae et sulcis haud notatae, rejiciantur. Eligantur, quae colorem exhibent e cinereo obsolete castaneum, quae rugosae sunt annulisque et incisuris profundis conspicuae. Odor corticis nullus, pulverisati nauseosus; sapor amaricans, acriusculus, inhaerens, cum sensu mucilaginis. Cortex crassus sit, durus, densus, fragilis, fractus particulis resinosis resplendens. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, insipida, subflavescente.

IRIS FLORENTINA. Fiolrod. Violenwurzel.

Iridis florentinae, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., RADIX tuberosa, sublato cortice ex Italia advecta, ponderosa, densa, candida; pollicem crassa, punctis e gilvo fuscis distincta, Violae Martiae odorem spirans; saporis leviter amaricantis, subacris, diutius in ore remanentis. Radices minores majoribus praestant.

JUGLANS. Valnoddeträe. Welscher Nussbaum.

Juglandis regiae, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., *fructus* CORTEX exterior parenchyma carnosum, succulentum viride, habet. Odor corticis non admodum gratus; sapor adstringens amarus. Arbor in hortis colitur.

JUNIPERUS. Enebär; Jenbärträc; Ene; Ener; Eine; Brist; Bruse; Nadka; Goskas. Wachholder.

Juniperi communis, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BACCAE grandes nigrae, resinosae, ponderosae. Odoris gravis; saporis subamari, subdulcis resinosi. Arbusculum in solo sterili spontaneum. Flor. Dan. Tab. 1119.

Ejusdem LIGNUM album, solidum, fragrans, saporis amaricantis, aut trunci aut radicis. Lignum radicis, quippe odoratum magis et efficax, priori praeferendum est.

Ejusdem e ligno et cortice destillatum OLEUM, e sylva Hercynia allatum, non raro Oleo Pini et Terebinthinae adulteratur.

K

KALI CARBONICUM. Vid. *Cineres Clavellati.*

KALI NITRICUM. Vid. *Nitrum crudum.*

L

LACCA; GUMMI LAC. Gummilak. Gummilack; Stangenlak.

Fici religiosae et Indicae vel alius arboris Indiae orientalis Massa resinoso cerasea e laeso cortice ramulorum exsudans et totum obducens, in qua Cocci Fici, Insecta haemiptera, nidulant. Sit rubra, fragilis, subpellucida, odoris et saporis vix ullius; masticata salivam tingit purpureo colore; aquam calidam chermosino, subsidente pulvere nigricante; spiritui vini impertit saporem subamarum, subadstringentem; accensa odorem primo gratum, deinde foetidum animalis substantiae spargit. Haec Lacca ramulos adhuc involvens sub nomine *Laccae in baculis*, ex Bengalia adfertur, et quo profundius rubra est, eo melior censetur. Vilioris pretii est pallida et perforata in granis solitariis, quae *Lacca in granis* dicitur. Ejusdem census est *Lacca in tabulis*, e granulata fusa et a foecibus purgata confecta, e flavo rubens pellucida et fragmentis Vitri Antimonii similis.

LAPATHUM ACUTUM. Hestesyre. Grindwurzel.

Rumicis acuti, Linn. Cl. VI. ord. Trigyn., RADIX perennis, pollicem crassa, octo vel decem pollices longa; coloris extus obscure rubelli, intus flavescentis; odor levis: sapor manifeste austerus et amarus. Planta fere ubique occurrit.

LAURUS. Laurbärträe. Lorbeerbaum.

Lauri nobilis, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., FOLIA recentia. Arbor Europae calidae propria. Folia fortiter sint olida non effoeta; odoris aromatici, balsamici graviusculi; saporis aromatici subamaricantis, coloris obsolete flavi, e gilvo olivaris.

acquiritur plumbo, cujus solutio cum Ammonio (alcali volatili) coeruleum non inducit colorem, quod contigit si cuprum admixtum fuerit.

LUPULUS. Humle. Hopfen.

Humili lupuli, Linn. Cl. XXII. ord. Pentandr., ad sepes in dumetis crescentis, CONI. Amenta florum foemineorum subrotunda vel oblonga, ovata, stramineo-spadicea; odoris fragrantis subnarcotici, gravis; saporis peramari inhaerentis. Flor. Dan. Tab. 1239.

LYCOPODIUM. Iordmos; Ulvefod; Lusegräs; Kraakestiig; Kraakefod; Söenkraakefod; Räverever. Bärlapp; Streupulvermoos.

Lycopodii clavati, Linn. Cl. XXIV. ord. Musc., in montosis et silvosis reperiundi, SEMEN vel potius Pollen subtilissimum, coloris flavi. Odorem et saporem habet nullum; instar cerae ad flammam ardet et quasi fulgurat, aquam autem respuit. Flor. Dan. Tab. 126.

M

MAGNESIA SULPHURICA. Vid. *Sal anglicanum.*

MAGNESIA VITRIARIORUM. Vid. *Magnesium oxydatum nativum.*

MAGNESIUM OXYDATUM NATIVUM; MAGNESIA VITRIARIORUM. Brunsteen. Braunstein.

Metallum magna cum quantitate oxygenii unitum, cinereo nigrescens, inquinans, in vase clauso ignitum gas oxygenium largiens. Rejiciendum illud, quod ferrum carbonicum aliaque heterogenea admixta habet.

MAJORANA. Mairan; Merian. Majoran.

Origani Majoranae, Linn. Cl. XV. ord. Gymnosp., HERBA annua in hortis culta; foliis ovatis obtusis ex viridi albicantibus; odoris fragrantis fortis; saporis aromatici, subamaricantis.

MALICORIUM. Vid. *Granatus*.

MALTHUM. Malt. Malz.

Hordei vulgaris, distichonis, hexastichonis, Linn. Cl. III. ord. Digyn., SEMINA post primam germinationem siccata.

MALVA. Katteost. Käsepappeln.

Malvae rotundifoliae, v. *sylvestris*, Linn. Cl. XV. ord. Polyandr., FOLIA. Planta annua ubique ad vias, sepes, in locis ruderatis proveniens. Odoris nullius; saporis mucilaginosi: mense Majo colligenda, non multum adulta. Flor. Dan. Tab. 721 et 1223.

MANNA. Manna Manna.

Fraxini orni varietatis rotundifoliae, Linn. Cl. XXIII. ord. Dioec., dum junior est aut LACRYMA sponte stillans, aut SUCCUS ex arbore vulnerata elicitus, gummoso melleus; maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam frau-

dulenter aguntur. Laudatur vulgo cannulata (en Marons) reliquisque jure praefertur. Sed in ipsa Mannae patria rarior et pretiosa est, et quae nobis sub hoc titulo obtruditur, factitia esse solet, e Manna sordida exoleta, Amylo, Saccharo et Scammonio in varias formas efficta. Ejusdem farinae venditur tabulata, quae e variis compacta non nisi pondere majore a sincera dignoscitur, et merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque sordidis allata; nec non, quae crassitudinis melleae (Manne grasse) aut impura est, pinguis, tenax, coloris rufi fusci (Manne rousse). Adulteratur enim variis supra dictis, Melle, Glauberi sale, variis succis purgantibus Tithymali vel Esulae speciebus, quibus Manna inprimis Brigantina (Manna de Briançon) scatere dicitur, quae, si sincera, lacryma est Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, si non Bombycina alba, dura et in vermium figuram contorta sed rarior, certe Mastichina, in granulis lacrymis aut grumis majoribus minoribusque (Manna en larmes) pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta pauxillum mannae liquidae mellis instar exsudans, levis, pura, parum pellucida, ab attactu in grumos minores dissiliens, non tenax aut sequax; saporis dulcis subacrescentis specifici, absque odore; super linguam plane deliquescens. Sicco calidoque servetur loco, in humidis enim diffluit in laticem ingratum inertem.

MARCASITA. Vid. *Pismuthum.*

MARRUBIUM. Marrube. Andorn.

Marrubii vulgaris, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA in ruderatis proveniens. Caulis erectus, tetragonus, albido-tomentosus. Folia opposita, subrotunda, rugosa, pubescentia, profunde crenata, obtusa. Odor fragrans, subvinosus; sapor amarus, inhaerens. Flor. Dan. Tab. 1036.

MASTIX. Mastix. Mastix.

Pistaciae Lentisci, Linn. Cl. XXII. ord. Pentandr., cicuris et ferae, in Europae australi et Archipelagi insulis crescentis, in Chio praecipue cultae LACRYMA, e sauciato cortice stillans, resinosa. Eligantur grana, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, splendentia. Dentibus tentata Mastix fragilis est, cerae instar lentescit, et pressione in pastam compingitur. In terram stillans resina sordes contrahit, unde his abundantes grumi (Mastix insortis dicti) merito rejiciuntur, aut saltem puriora ex his frusta studiose seliguntur. Suspecta pariter est, quae in sic dictis panibus affertur, cum ex vulgari impura, aqua bulliente ut candidior fiat, soluta compingatur. Addunt etiam verae Mastichi, quam Masculam incolae vocant, Foemininam, quae est lacryma Pistaciae verae et Terebinthi opaca, viscosa, Terebinthinae non absimilis. Haec cum vera Mastiche confusa, siccos externa specie panes refert, qui vero diffracti, non perspicuis particulis, viscosa indole, et mollitie fraudem patefaciunt.

MATRICARIA. Matrum. Mutterkraut.

Matricariae Parthenii, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA cum FLORIBUS, in ru-

deratis et cultis crescens. Caulis erectus, bipedalis, striato angulatus, glaber, ramosus. Folia alterna petiolata, pinnatifida; pinnis suboppositis, ovato-oblongis, inciso serratis. Flores corymbosi, terminales, compositi radiati: radio albo, disco flavo. Odor fragrans, graviusculus, in Chamomillam et Tanacetum incidens; sapor amaricans, aromaticus, calidiusculus. Flor. Dan. Tab. 674.

MEL. Honning. Honig.

Apis melliferae, Linn., e nectario et polline florum PRODUCTUM resinoso mucilaginosum, spissioris consistentiae, tum album, tum pallide flavescens, vel etiam saturatius; odoris grati, saporis dulcissimi. Praeter plantarum, e quibus mel colligitur, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendet, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est virgineum (Jomfruehonning, Jungferuhonig) nulla adhibita arte, e favis juniorum apium diffractis, craticulae impositis, destillans. Delicatius deprehenditur mel Narbonense, ubi Rosmarinus aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius est expressum, ceram redolens, deterrimum elutum coctum. Adulteratum farina, magis albidum est, vix odorum, glutinosum: consistentia, color, odor, sapor aliarum fraudum criteria sunt. *Mel despumatum* (klaret Honning, geläuterter Honig) in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

MELAMPODIUM. Vid. *Helleborus niger*.

MELILOTUS. Amur; Meloten; Steenklover. Steinklee; Meleloten.

Trifolii Meliloti officinalis, Linn. Cl. XVI. ord. Decandr., COMA, in campestribus habitans, floribus sive albis sive luteis, mense Julio colligenda. Odor siccae longe fragrantior, quam recentis; sapor subamarus, herbaceus. Flor. Dan. Tab. 934.

MELISSA CITRATA. Citron-Melisse; Citron-Hiertensfryd. Citron-Melisse.

Melissae officinalis, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA, junior et antequam verticillos florentes emittat, colligenda, in hortis culta. Odorem recens et sicca fragrantem, fere flavedini corticis citri similem; saporem sicca acrem, aromaticum habet.

MELO. Melon. Melone.

Cucumeris Melonis, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., SEMEN, in hortis colitur, mense Julio et Augusto maturescit. Sunt ovata, oblonga absque odore, et sapore dulciuscula.

MENTHA CRISPA. Krusemynte. Krausemünze.

Menthae crispae, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA, colligenda antequam spicam florentem protrudat. In hortis provenit; odorem recens ac sicca fragrantem habet, fortem non admodum gratum, spirituosum; saporem calidum aromaticum, cum levi amaritie.

MENTHA PIPERITA. Pebermynte. Pfeffermünze.

Menthae Piperitae, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA, in hortis culta. Odorem sicca et recens fragrantem, spirituosum, subcamphoratum habet; saporem recens aromaticum, fervidum, camphoraceum, linguam calefacientem, subsequente sensu frigidiusculo; sicca fortiorem.

MERCURIUS; ARGENTUM VIVUM; HYDRARGYRUM. Quiksölv. Quicksilber.

Hydrargyrum virgineum est metallum fluidum, in summo frigoris gradu solidescens, malleabile, coloris splendidi argentei, valde ponderosum et in igne mediocri totum evaporans. Purum et adulterationis non suspectum, facillime globulis exacte rotundis, levissime iterum coëuntibus currens in charta, in cursu nihil relinquens impuri, acetum minime dulcificans, vel plumbeas particulas per reagentia detegendas minime prodens, per corium expressum fere nihil impuri sive pulverulenti relinquens dignoscitur. Invenitur sive nativum, Mercurius virgineus dictus, sive sulphure in Cinnabarim versus, in quem ubi vertitur, pro variis quibus inhaeret terris, varias mineras efformat. Sit parum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in Cochleari ferreo supra carbones degitur, ubi avolat mercurius, relicto metallo admisto. Cujus superficies non nitet, sed fusca et quasi membranula obducta apparet, tardius et globulis quasi caudatis currens, nigra vel cinerea vestigia relinquens, adulteratus est. Sapor dulcis aceti

cum mercurio digesti, et color obscurus ex admisto liquore vini probatorio Hahnemanni, denotat depravationem cum plumbo: acidum nitricum mercurio affusum, Stannum commistum in oxydum album corrodit. Bismutho inquinatus, in aqua forti pura solutus mercurius, affusa aqua destillata, albo praecipitatur colore, quod praecipitatum est oxydum Bismuthi. Pro usu medico optime instituitur revivificatio mercurii via humida, coctione cum ferro in aquae sufficienti quantitate, e sublimato corrosivo albo. Ex Idria, Hispania, India orientali et Palatinatu obtinetur.

MEZEREUM. Kielderhals; Tisbast; Kiusbast. Kellerhals; Seydelbast.

Daphnes Mezerei et *Daphnes Laureolae*, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., CORTEX tenuis striatus, subluteus, epidermide ex viridi fusca superinductus, intus viridescens. Saporis peracris urentis; odoris nullius. Fruticis Hispaniae, Galliae et Germaniae meridionalis, nobis hortensis.

MILLEFOLIUM. Röllike; Harhöns; Barbek; Jordhumble. Schaafgarbe; Rölk.

Achilleae millefolii, Linn. Cl. XIX. ord. Poligam., superfl, HERBA cum floribus, per campos et in pascuis vulgaris; odoris subaromatici, balsamici; saporis subadstringentis, amaricantis; mense Julio colligenda. Flor. Dan. Tab. 737.

MINIUM. Mönnie. Mennich; Rother Menich.

MUSCUS ISLANDICUS. Vid. *Lichen islandicus.*

MYRISTICA NUX. Vid. *Moschata.*

MYRRHA, s. GUMMI MYRRHAE. Myrrha. Myrrha.

Arboris nondum cognitae in Aethiopia et Abyssinia habitans, GUMMI RESINA. Laudant Stactem, sive sponte exsudantem, quae vero rarissime, si unquam occurrit. Optima est, quae in Granis sive Lacrymis adfertur. Eligatur vero pura, fulva aut e fulvo ferruginea, spiritu adflato magis rubescens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, splendens, fracta strias semicirculares, albas, caesias exhibens, in ore omnis fere deliquescens; odoris validi specifici, non adeo ingrati; saporis multum amari, aromatici. Rejiciatur fusca, nigra, tenax, tota resinosa, albicans; impura, et odore nauseoso praedita.

N.

NASTURTIUM AQUATICUM. Vandkarse. Brunnenkresse.

Sisymbrii Nasturtii aquatici, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., HERBA biennis, crescens ad rivos et fontes spontanea. Odoris, si recens teratur, volatilis, proprii; saporis subamaricantis leviter acriusculi. Flor. Dan. Tab. 690.

NATRUM CARBONICUM. Vid. *Soda.*

NATRUM MURIATICUM. Vid. *Sal Gemmae.*

NICOTIANA. Vid. *Tabacum.*

NITRUM CRUDUM; KALI NITRICUM. Salpeter. Salpeter.

Nitrum nativum, SAL NEUTER ex acido nitri et Kali constans, ex propriis terris peculiari ratione excoctum, depuratum, Crystallos prismaticos hexaëdros efformans. Eligatur purum, album, crystallos longos exhibens, in manu clausa crepitationis sonum edens, carbonibus ignitis inspersum absque crepitatione cum obliqua et rubra flamma et strepitu prompte deflagrans, atque in aqua, maxime calida, *facile* solubile; saporis acris amaricantis, refrigerantis, quale ex India orientali nativum adfertur. In nitrariis nostris quoque gignitur. Terram calcaream, Kali muriaticum et Magnesiam muriaticam, plerumque continet nondum depuratum.

NUX VOMICA. Krandsöine. Krähenaugen; Kranzaugen.

Strychnos nucis vomicae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., NUCLEUS, compresse ovatus, tenax, cinereus, corneae duritiei, villis ex cinereo splendentibus obsitus, saporis summe amari. Ex Malabaria advehitur.

O

OLEUM ASPHALTI. Vid. *Asphaltum.*

OLEUM de CEDRO. Vid. *Citrus.*

OLEUM JUNIPERI. Vid. *Juniperus.*

OLEUM LAURI. Vid. *Laurus.*

OLEUM PETRAE ALBUM. Vid. *Petroleum album.*

OLEUM RICINI. Vid. *Cataputia major.*

OLEUM TEREBINTHINAE. Vid. *Terebinthina.*

OLIBANUM; THUS. Virak. Weihrauch.

Juniperi Thuriferae v. *Juniperi Lyciae*, Linn. Cl. XXII. ord. Monandr., RESINA, ex Oriente vel Aegypto advecta, ex albo sublutea, semipellucida, dente tentata friabilis, deinde lenta, sequax, non tamen uti Mastix in pastam conglutinata; odoris fragrantis, saporis amari non ingrati; super ignem non liquescens, sed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum, rufum, impurum, ramentis corticosis et quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adulteratur resina Pini et Laricis, inprimis lacryma Pini Piceae, quae Thus vulgare vocatur. Est vero haec coloris e flavo et rufo variegati; saporis amari non adeo grati, et super ignem explorata, Terebinthinam redolet.

OLIVARUM OLEUM. Bomolie. Baumöl.

Oleae Europaeae, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., in Europa australi cultae, e fructibus expressum OLEUM UNGUINOSUM. Praestat e Lusitania, Italia et Gallo-provincia allatum, ex albo leviter viridescens, sine amurca, absque sapore aut falso, aut rancido, et dum recens est inodorum. Frigore in massam penitus albam coit, et quo citius hoc facit, eo praestantius. Quod secunda obtinetur expressione,

magis flavescit, et cum sordibus mucilaginosi quid praecipitat, unde facilius rancescit.

ONONIS SPINOSA. Kragetorn; Hestegilding; Langfienderod. Haubechel.

Ononidis spinosae nec non *Ononidis arvensis*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., RADIX spithamea, pedalis vel ultra, crassitie pennae cygneae, digiti vel pollicis; fibrillosa, extus fusca, intus albida. Recentis odor Pisi siccati, sapor consimilis subamaricans; masticata admodum tenax. Ubique in arvis et campis invenitur. Flor. Dan. Tab. 783.

OPIUM. Opium; Valmuesaft. Mohnsaft.

Papaveris somniferi, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., SUCCUS gummeo-resinosus. Primaria ex incisis Papaverum capitibus exsudans Lacryma, verum antiquorum opium, Affion inquilinis dictum, ac solis calore in massulas obscure fulvas rufasque coactum, ad nos non pervenit. Adfertur vero succus posthac expressus, aut e capitibus contusis coctus, et ignis ope in massas majores inspissatus, quem tamen ab admistis succis heterogeneis, affinis inprimis (Chelidonii glauci et corniculati) non plane immunem esse perhibent. Forma glebae aut panis foliis involuti, externe fusci, subinde pulli coloris advehitur. Thebaicum vulgo expostulatur Opium; sed perinde est qua patria gaudeat, Aegypto, India orientali, Persia, Anatolia, quae prae reliquis est papaverifera; modo sequentibus se commendet dotibus. Sit densum, ponderosum, coloris externe e fulvo, rufo, vel spadiceo fusci, fractum particulis splendentibus

micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum pauxillum tenax, purum; odoris validi, tetri, virosi; saporis amari, acris, fervoris aliquo sensu fauces adurentis; prompte flammam concipiens; omnino fere aqua solubile et rubicundam exhibens tincturam. Quod variis vegetabilium fragmentis, sabulo et quisquiliis scatet, colorem obsolete pullum, aut e murino pullum exhibet, et odoris adusti vel exigui est atque friabile, rejiciatur. Extractum totius plantae Meconium antiquorum fuisse dicitur. Quod e Bengalia et America adfertur, rejiciatur.

OPOPANAX. Panaxgummi. Panaxgummi.

Pastinacae Opopanacis, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI RESINA granulosa, rufo-lutescens, intus pallidior; odoris gravis, nauseosi; saporis subamaricantis nauseosi, plerumque in glebulis nucis Avellanae vel Juglandis magnitudinis conglutinata. Rejiciantur glebae fuscae, nigrae, multis quisquiliis commixtae. Adfertur praesertim ex Asia nec non ex Europa australi.

ORIGANUM. Vild Mairan; Tostkonning; Rospons Skaarekonge; Bergkonge; Bergmynte; Skovmynte; Skarmynte; Klevhumle; Vildmynte. Brauner Dosten; Wintermajoran.

Origani vulgaris, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA cum floribus, in dumetis crescens, mense Julio colligenda. Odorem habet tam sicca quam recens fragrantem, ad Majoranam accedentem, saporem acrem aromaticum. Flor. Dan. Tab. 638.

OVA GALLINAE. Hönseæg. Hühnereyer.

Phasiani Galli, Linn. Cl. II. ovi Gallinae ALBUMEN. Saporis fatui, gelatinosi.

Ejusdem VITELLUS. Pars flava ovi, saporis gelatinosi.

OXYCOCCOS. Tranebaer. Moosbeeren.

Vaccinii Oxycocci, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., BACCAE sphaericae, laeves, eleganter coccineae. Odor nullus; sapor acidulus substypticus. Planta in paludibus ubique proveniens. Flor. Dan. Tab. 80.

P

PAPAVER ALBUM. Hvid Valmue. Weisser Mohn; Mohnsaamen.

Papaveris somniferi, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., SEMEN, varietate album, globosum, minimum, reniforme, oleo dulci repletum.

PASSULAE MAJORES. Rosiner. Rosinen.

Vitis viniferae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., UVAE, solem passae et siccatae. Eligantur longae, pauca continentes semina, torosae, pingues, tenera cuticula tectae, lumini admotae pauxillum pellucidae, in fictilibus sub denominatione Potrosiner allatae. Damascenae et Syriacae praestant prae Hispanicis et Italicis. Saporem habent subacidulo-dulcem.

PASSULAE MINORES; CORINTHIACAE. Corender. Kleine Rosinen; Corinthen.

Vitis apyrenae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FRUCTUS. Uvae maturae et siccatae, magnitudine seminis Pisi, subrotundae, rugosae, molles, subsaccharatae, undique lucidiusculae, fuscae; parenchymate pulposo. Odor vix ullus; sapor dulceacidulus. Frutex in variis Insulis Maris mediterranei proveniens.

PECHURIM s. PECURIM FABA; PECAIRO. Pichurimbönne. Pichurimbohne; Brasilianische Bohne.

Lauri Pechurim? Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., FRUCTUS. Amygdalae majoris per longitudinem dissectae et excavatae, similitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus, longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fusci instar nucis Moschatae; odoris et saporis ex nucis Moschatae et ligni Sassafras mixti. Expressione spissum et album oleum, odoris Sassafras largitur. Ex Brasilia et Paraguai adfertur. Spuria faba Pechurim verae substituitur, longe majoris magnitudinis: extus est rugosa et pallidior, intus vero obscurioris coloris, uti et durior atque amarior, sed minus aromatica, adeoque est rejicienda.

PETROLEUM ALBUM; OLEUM PETRAE ALBUM. Hvid Steenolie; Peterolie. Weiszes Stein-oder Bergöl.

Bitumen Petroleum est bitumen liquidum levissi-

mum et fluidissimum, Naphta dictum, e terra aut rimis saxorum exsudans, aquae et spiritubus, si purum sit, supernatans, facillime inflammabile, celerrime avolans, cum flamma ex flavo coerulescente, et spisso multum fuliginis deponente fumo ardens, in aethere aliisque, non autem in spiritu vini et aqua solubile. Odoris et saporis est penetrantis, haud ingrate aromatici, Oleo Succini rectificato similis. Adfertur ex insula Sumatra, Persia et ducatu Modenensi, sed rarissimum est.

PETROSELINUM. Persille. Petersilien.

Apii Petroselini, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN recens, viride, oblongum, striatum, parvum, graveolens, odoris et saporis calidi et aromatici. Sufficit nostras, et recens praestat prae vetusto Petroselini Macedonici (Bubonis Macedonici) semine.

PHELLANDRIUM; FOENICULUM AQUATICUM. Vandfennikel. Wasserfennikel; Peersaat.

Phellandrii aquatici, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN oblongum, striatum, odoris gravis ingrati, saporis aromatici, acris, medium inter Angelicam et Levisticum tenentis. Planta biennis, in fossis, ad lacus haud infrequens. Flor. Dan. Tab. 1154.

PIMPINELLA ALBA. Qvaeseurt, Biergroed; Pimpinelle. Bibenell.

Pimpinellae saxifragae, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX perennis, tenuis, fibras minores, maxime e capite crassiore emittens; coloris extus pallide

flavescentis, intus albicantis; odorem habet recens Radix fragrantem, sternutationem facile inducentem, saporem intense acrem, calidum; in siccis, sabulosis ac saxosis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, saporis eximie pungentis. Inertior est quae in pratis humidisque crescit locis. Flor. Dan. Tab. 669.

PIPER INDICUM v. HISPANICUM. Spansk Peber. Spanischer, Indischer oder Türkischer Pfeffer.

Capsici annui, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FRUCTUS, bacca exsucca plerumque turbinata, subincurva, coccineo rubra, nitida. Semina minuta utrinque compressa, glabra, pallida, sapore acerrimo pungente diu inhaerente, ex America meridionali allata.

PIPER NIGRUM. Sort Peber. Schwarzer Pfeffer.

Piperis nigri, Linn. Cl. II. ord. Trigyn., Sirium Rumphio dicti, BACCAE monospermae. Eliguntur grana magna, compacta, ponderosa, non rugosa. Aliquem odorem specificum, et vehementer calidum vel igneum saporem habent. Est immatura et viridis bacca, cujus color sub exsiccatione obscuratur, cum e contra *Piper album* sit bacca plane matura et cortice spoliata.

PIX LIQUIDA. Vid. *Terebinthina.*

PIX SOLIDA. Vid. *Terebinthina.*

PLUMBUM. Blye. Bley.

Plumbum, metallum ex albo coerulescens, ductile, molle, via sicca oxygenium facile attrahens, et acido acetico nuptum sapore subdulci praeditum.

PLUMBUM CARBONICUM. Vid. *Cerussa alba.*

PLUMBUM OXYDATUM. Vid. *Lithargyrium.*

POLYGALA AMARA. Korsblomster. Kreutzblumen.

Polygalae amarae, Linn. Cl. XVII. ord. Octandr., PLANTA perennis, in regionibus australibus crescens. Odor nullus; sapor amaricans, acidulus, mucilagineus.

Ejusdem RADIX. Odoris et saporis ejusdem, nisi quod sapor in radice. Flor. Dan. Tab. 1169.

POLYPODIUM. Engelsodt; Eegebregne; Mariebregne; Steensöte; Sysselroet; Heilsota. Engelsusz.

Polypodii vulgaris, Linn. Cl. XXIV. ord. Filic., RADIX, in silvis et ad muros antiquos frequens, perennis, fibrosa, geniculata, ad radices quercuum et in rudetis locisque siccis germinans; extus e spadiceo fusca, intus obsolete viridis; compagis tenacis; odoris nullius; saporis praedulcis, remissioris quam Liquiritiae. Flor. Dan. Tab. 1060.

POPULUS. Poppelpiil. Pappelbaum.

Populi nigrae, Linn. Cl. XXII. ord. Octandr., OCULI. Gemmae nondum evolutae, succo flavescente balsamico turgidae, odoris fragrantis, saporis amari, Aprili mense decerptae. Praestant recentes.

PRUNA. Blommer. Pflaumen.

Pruni domesticae, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., DRUPAE siccatae, torosae et carnosae, sine ingrato a fumigatione odore. Pulpam acido-dulcescentem largiuntur.

PRUNEOLA. Bruneller. Prunellen.

Pruni Brignolensis, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., DRUPAE. A nuce separatur caro. Sint recentia, semipellucida, coloris e buxeo spadicei, mollia, humidula; odoris debilis; saporis acidulo-dulcescentis. Adferuntur e Gallo-provincia.

PTARMICA. Hvid Regnfan. Weisser Bertram; Weisser Reinfarren; Wiesendragun.

Achilleae Ptarmicae, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., RADIX. Planta perennis, in pratis subhumidis crescens, lignosa, capillata, inodora; saporis acris ad radicem Pyrethri accedens. Flor. Dan. Tab. 643.

PULSATILLA NIGRICANS. Sort Koebielde. Schwarze Küchenschelle.

Anemones pratensis, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., PLANTA perennis vernalis, in sterilibus campis crescens; odoris vix ullius; saporis acris, inhaerentis, masticando linguam corrodentis. Flor. Dan. Tab. 611.

Q

QUASSIA. Bestindisk Bittertraee; Qvassietraee; Qvassiebark. Surinamisches Bitterholz; Westindisch Bitterholz; Quassienholz.

Picramiae excelsae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., LIGNUM subalbidum, compactum et valde amarum, praecipue Radicis. Arbor in insulis Antillis ad oras fluviorum crescens. Nullius est odoris; saporis autem intense amari, praesertim in cortice radicis.

QUERCUS. Egetraee. Eichenbaum.

Quercus roboris, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., FOLIA tenella. Arbor ad nostrates pertinet; saporem acerbum stypticum habet.

Ejusdem CORTEX si extus cinereus, hinc inde albescente musco obsitus, intus autem ex albo flavescens, a siccatione fuscus evadens. Odorem satis notum habet, et saporem adstringentem amarumque.

GLANDES Quercus. Hujus arboris fructus maturi absque cupula. Nux ovalis cupula triplo longior; testa pergamena, laevis, nitidiuscula, fragilis, coloris straminei; nucleo extus rugoso, bipartibili, solido, pallido. Odor nullus; sapor acerbus stypticus.

R

RAPARUM OLEUM. Roe-Olie. Rüb-Oel.

Brassicae Rapae, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos.,

OLEUM e seminibus expressum, recens non rancidum.

RAPHANUS RUSTICANUS. Vid. *Armoracia*.

RESINA COMMUNIS. Vid. *Terebinthina*.

RESINA ELASTICA; CAOUTCHOUC. Elastisk Harpix. Lederharz; Elastisches Harz; Federharz.

Jatrophae elasticae vel aliarum arborum Indiae occidentalis, RESINA, obscure spadicea vel lutea, opaca vel pellucida, mollis, elastica; odoris nullius; saporis debilis, facillime et plane in aethere sulphurico solvenda.

RESINA GUAJACI. Vid. *Guajacum*.

RESINA JUNIPERI. Vid. *Sandarach*.

RHABARBARUM; RHEUM. Rhabarber. Rhabarber.

Rhei palmati, Linn. Cl. IX. ord. Trigyn., RADIX tuberosa, cum duritie aliqua fragilis, levis, probe sicca, externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea cum albis et rubellis venulis, nucis Moscatae instar. Eligatur variegata, ex Asia advecta. Odorem habet sicca gravem, specificum, subnauseosum; saporem amaricantem, subnauseosum, subacrem, cum adstrictionis aliquo sensu, salivam flavedine tingentem. Quae ex China adfertur, est RADIX *Rhei undulati* Linn.

RHAMNUS CATHARCTICUS; SPINAE CERVINAE BACCAE. Korsbaer; Brietorn; Viebaer; Hiortebaer; Jeitelbaer. Kreuszbeeren; Weiszdornbeeren.

Rhamni catharctici, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., BACCAE, semine triangulari et succo e purpureo viridescente, ab aliis baccis admixtis distinguendae. Odoris recentium baccarum, Padi similis; saporis primum dulcescentis nauseosi, odori congrui, deinde substyptici. Flor. Dan. Tab. 850.

RHEUM. Vid. *Rhabarbarum*.

RIBESIA NIGRA. Soelbaer. Gichtbeeren.

Ribium nigrarum, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA, tenera, subcordata, trilobata, subtus punctis elevatis, luteis, aspersa; odore fragrante peculiari, odorem lotii felis haud male referente; sapore subaustero.

BACCAE ejusdem nigrae, odoris debilioris, ac saporis dulcescentis acidulo-subfalsi. Flor. Dan. Tab. 556.

RIBESIA RUBRA. Röde Ribs. Rothe Johannisbeeren.

Ribis rubrae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., BACCAE. Odoris vix ullius; saporis subvinosi, dulcescentis aciduli, globosae, rubrae, subdiaphanae.

RICINUS VULGARIS. Vid. *Cataputia major*.

ROSA INCARNATA. Röd Rose; Fyldrose. Rothe Rosen.

Rosae centifoliae, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FLORES. Petala pallide rubentia; odoris gratissimi et saporis subadstringentis, evitatione staminum, germinum atque calycum, ante plenam evolutionem colligantur.

ROSA RUBRA. Edikerose. Essigrose.

Rosae Damascenae, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., PETALA, ex fusco rubentia, odoris grati, saporis adstringentis. Rejiciantur stamina, germina, uti etiam folia calycina.

ROSMARINUS. Rosmarin. Rosmarin.

Rosmarini officinalis, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA; odoris fragrantis, fortis; saporis calidi, acris, camphoracei.

Ejusdem FLORES.

ROSMARINUS SYLVESTRIS. Bild Rosmarin. Wilder Rosmarin; Heydebienenkraut; Post.

Ledi palustris, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., FOLIA, in paludibus uliginosis provenientia, mense Junio colligenda; odorem habent gravem, subaromaticum; saporem subamarum, subadstringentem. Flor. Dan. Tab. 1031.

RUBIA TINCTORUM. Krap. Kreppe; Färberröthe.

Rubiae tinctorum, Linn. Cl. IV. ord. Monogyn., RADIX perennis, repens, geniculata, recens, non nigra aut maculis interspersa, sed eleganter et dilute rubens, atque, quantum fieri potest, a parenchymate lignoso liberata. Odor contusae fere incidens in corticem Sorbi; sapor subamarus.

RUBI CHAMAEMORI BACCAE. Multebaer; Myrebaer; Laamanak; Lato'ch; Laddoch. Pautkenbeeren.

Rubi Chamaemori, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FRUCTUS, e Norvagia advecti. Odoris vix ullius; saporis aciduli. Flor. Dan. Tab. 1.

RUBUS IDAEUS. Himbaer; Hindbaer; Bryngebaer. Himbeeren; Hindbeeren; Hohlbeeren.

Rubi Idaei, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., BACCAE rubrae vel pallide luteae, conico hemisphaericae, ex acinis succulentis subrotundis, monospermis, serie triplici vel quadruplici annulari dispositis, constructae; odore fragrante, suaveolente, gratissimo; sapore grate acidulo, odori congruente. Flor. Dan. Tab. 788.

RUTA. Rude. Raute; Weinraute.

Rutae graveolentis, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., HERBA, in hortis culta; odorem habet fortem, gravem, neque tamen ingratum; saporem amarum, gravem, acrem. Uterque in siccata herba debilior. Recens inprimis adhibenda.

S

SABADILLA. Sabadillekorn. Sabadillkörner; Mexicanischer Lausesaamen.

Veratri Sabadillae? Linn. Cl. XXIII. ord. Monoec., SEMEN oblongum, subcylindricum, figura et colore nigricante Muscerdam referens, propria tunica obvelatum, e regno Mexicano allatum. Odor vix ullus, sed pulverisati vehemens errhinus; sapor capsulae ipsius nullus, seminum vero acerrimus, amarissimus, acrimonia diu inhaerente, etiam si fauces aqua frigida probe eluantur, cum sensu intermixto subdulcis saporis.

SABINA. Sevenbom. Sadenbaum; Sewenbaum.

Juniperi Sabinae, Linn. Cl. XXII. ord. Monadelph., FOLIA, vel potius frondium apices, verno inprimis tempore collecti, siccati. In hortis colitur. Odoris gravis, resinosi, ingrati; saporis amari, calidi.

SACCHARUM. Sukker. Zucker.

Sacchari officinalis, Linn. Cl. III. ord. Digyn., SAL essentiale, ex Indiis et America allatum, Crudum neque denuo depuratum, farinaceum, Puddersukker, Moscovade; repetita solutione, addita calce crystallisatum, *Canariense*, Fiinfiin; in grandiores denique crystallos redactum, *Candum flavum*, Sukker-Candis vocatur. Sal essentiale dulcissimum, sapidissimum, solubile; solvitur in aqua, difficilius in vino, difficilline in spiritu vini.

SACCHARUM LACTIS. **Melksukker. Milchzucker.**

Seri lactis, quod sponte e lacte secessit, SAL essentiale, ex Helvetia plerumque allatum, constans crystallis parvis, semipellucidis, aegre solubilibus; coloris lactei, saporis debilis saccharini et terrestris. Advehitur in frustis variae magnitudinis, supra crystallisatis, infra glabris, praestans venali pulverato, saccharo communi intermixto.

SAGAPENUM. Sagapen-Gummi. Sagapen.

Ferulae? cujusdam GUMMI RESINA, in Media, Persia, aliisque orientalibus regionibus proveniens. Eligatur granulatum, translucidum, extus fulvi aut rufi coloris, intus dilutioris; odoris fortis, ingrati, alliacei; saporis gravis, amaricantis, calidi et acris, ad Porrum accedentis. Rejiciantur glebae concretae et veluti fusae, coloris obscuri, sordidi.

SAL ACETOSELLAE. Vid. *Acetosella.*

SAL ANGLICUM; SAL CATHARTICUM; SAL EBSHAMENSE; MAGNESIA SULPHURATA ANGLICA. Engelsk Laxeersalt. Englisches Laxiersalz.

Est *sal medium terrestre*, e pura Magnesia et acido sulphurico constans. Elicitur e fonte Ebshamensi v. Seidlicensi, vel ex ultimo salis marini lixivio. Crystallos habet teneros aciculares. Solubile est in triplo aquae purae. Saporem habet salsum amaricantem.

SAL GEMMAE; SAL CULINARE; NATRUM MURIATICUM. Steensalt. Steinsalz.

Muria fossilis pura, ex acido muriatico et natro constans, semipellucida, post lungum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans, percussa in cubos minores, attamen regulares, dissiliens. Saporem habet salsum, sali communi perfecte similem. Coloris rubelli vel alius alieni rejiciatur.

SAL SEIDLICENSE. Seidlitzersalt. Seidlitzersalz.

Ex iisdem, quibus Anglicum, partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album et crystallisatum.

SALAB; SALEB. Salab; Salaprod. Salapwurzel.

Orchidis morionis, militaris, maculatae, pyramidalis, latifoliae, Linn. Cl. XX. ord. Diandr., RADICES perennes, figurae ovalis vel palmatae, semipellucidae, coloris e griseo-albi. Odoris, dum recentes sunt, hircini; saporis vix ullius, bulbus masticatus mucilaginosus, fere insipidus. Orchis morio Flor. Dan. Tab. 253; maculata Tab. 933; latifolia Tab. 266.

SALIX. Piil. Weiden.

Salicis albae, pentandrae, fragilis, vitellinae, Linn. Cl. XXII. ord. Diandr., CORTEX levis; odoris balsamici et saporis adstringentis amari. Salix pentandra Flor. Dan. Tab. 943.

SALVIA. Salvie. Salbey.

Salviae officinalis, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., FOLIA adultiora efficaciora. Planta perennis, hortensis; odoris fortis, graviusculi; saporis amaricantis, aromatici, calidi.

SAMBUCUS. Hyld. Hollunder; Flieder.

Sambuci nigrae, Linn. Cl. V. ord. Trigyn., CORTEX, verno tempore detrahendus, melior qui externum cinerei coloris sequitur, viridis; odor recentis ingratus, virosus; sapor primum dulcescens, deinde amaricans, acris, nauseosus. Arbor in Dania frequentissima.

Ejusdem FLORES odorem habent fortem, non ingratum, saporem amaricantem mucilaginosum. Siccentur celerrime.

Ejusdem BACCAE, magnitudinis seminis Pisi minoris. Recentium odor debilior; sapor acidulus. Succum viridescentem, rubicundum, non ingratum largiuntur. Flor. Dan. Tab. 545.

SANDARACH; SANDARACA; GUMMI JUNIPERI. Enebaer-Gummi. Wachholderharz; Firnisz.

Juniperi vel *communis* vel *Oxycedri* (secundum Cl. Schousboe *Thujae articulatae*), Linn. Cl. XXII. ord. Monadelph., RESINA, ab ora Africae advecta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, splendida, pellucida, odoris grati, mastigini; saporis debilis. In spiritu vini perfecte solvitur, sed non in aqua; in oleo expresso solvitur imperfecte.

SANGUIS DRACONIS. Drageblod. Drachenblut.

Calami Rotang., Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RESINA, e fructibus exsudans, iisque superinducta indurescens, quae deinde calore emollita in baculos oblongo-compressos vel in globulos oviformes, magnitudine nucis Myristicae formatur, qui singulatim concatenatimque arundine involuti, ex India orientali advehuntur. Genuina est fragilis, externe obscure badia, interne dilutior, trita eleganter Kermesina, fractura laevis, subgranulosa, nitens, opaca, in frustis minoribus autem subdiaphana; odoris et saporis nullius. Carbonibus ignitis injecta liquescens, ebulliens, nigrescens, odorem substoracinum spargens. Masticata et in aqua insolubilis; in spiritu vini rectificato vero solvitur. Vilior est, quae decoctione e nucleis contusis extrahitur. Quae e variis resinis composita, sanguine hirci aut pigmentis terreis commixta, signo brasiliensi aut Draconis resina tincta, et in tabulis vel in massis informibus redacta, rejicienda.

SANTONICUM. Vid. *Cina.*

SAPO ALICANTINUS. Spansk Saebe. Spanische Seife.

Ex oleo olivarum atque lixivio, quod e binis Sodae, una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPO, maximam partem Marsiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore,

corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejicitur variegatus, nec unquam usibus internis inserviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admixtam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

SAPONARIA. Saebeurt. Seifenkraut.

Saponariae officinalis, Linn. Cl. X. ord. Digyn., RADIX perennis, ramosa, geniculata, repens, ad rivos, fossas et in humidis habitans, verno tempore collecta. Saporis sit dulcis primum et glutinosi, deinde acris, amaricantis. Non confundatur cum radice Lychnidis Dioicae aut Cucubali Behen. Flor. Dan. Tab. 543.

SARSA; SARSAPARILLA. Sarsaparil. Sarsaparill.

Smilacis Sarsaparillae, Linn. Cl. XXII. ord. Diandr., RADICES tenues, longae ex America australi advectae, parum rugosae; sub cortice ex rubello viridescente materiam albam ramentosam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Sapor farinosus est, vix amaricans, obvolvens. Durae fragiles, lignosae, farinaceae, rejiciantur.

SASSAFRAS. Sassafras. Fenchelholz.

Lauri Sassafras, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., LIGNUM cum CORTICE. Lignum sit obsolete rubrum, leve, spongiosum; odoris foeniculi, tectum, cortice ferrugineo aspero; saporis foeniculi, sed validioris. Prunis injectum crepitet instar salis communis. Vis major inest frustis ramusculorum, inpri-

10*

mis radicum parvarum dilutioris coloris, quam truncis majoribus. Advehitur ex America.

SCAMMONIUM. Skammonium. Scammonium.

Convolvuli Scammoniae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., SUCCUS gummoso-resinosus, ex Oriente allatus. Eligendum Scammonium Aleppense, leve, spongiosum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum splendore aliquo; in pulverem redactum ex albo cinereum; aqua aut saliva solutum, ex obsolete viridi aut cumatili lactescens; odoris ingrati, virosi; saporis acris, nauseosi. Rejiciatur Smyrnense e variis aliis Convolvuli speciebus plantisque lactescentibus, Esulae, Tithymaloides, Apocyni, Periplocae etc., sobole coactum, impurius, gravius, nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Sed neque Aleppense castum semper purumque, verum callidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognosci nequeat. Hoc solum scimus, nonnumquam interponi Scammonium Monspeliacum (Cynanchi Monspeliaci succum lactescentem, coctione inspissatum) paulo gravius magisque nigrum, sed virtutis catharticae debilioris.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS. Oliebille. Maywurm; Maykäfer.

Meloë Proscarabaeus, Linn. Cl. V. ord. Coleopter., corpore violaceo; in apricis campis habitans, vivus melli immersus, capite detruncato.

SCORDIUM. Lögurt. Lachenknoblauch.

Teucrii Scordii, Linn. XIV. ord. Gymnosp., HERBA, in paludosis germinans, mense Junio colligenda; odorem habet Allium cum levi Aromate spirantem; saporem intense amarum. Flor. Dan. Tab. 593.

SENEGA. Senega. Senega.

Polygalae Senegae, Linn. Cl. XVII. ord. Octandr., RADIX, ex America septentrionali advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta; saporis primo farinacei, mox subacidi, denique acris pungentis.

SENNA. Senne. Senesblätter.

Cassiae Sennae, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., FOLIA, ex Arabia aut Alexandria advecta. Sint e luteo subviridia, parva, subovata, in apice multum acuminata, molliuscula tactu, non ingrate olentia; saporis subacris amari, aliquantum nauseosi. Alexandrina folia sunt optima, viridia cum suffuso flavo. Impura, maculata, e rufo flava rejiciantur. Virtute ad Sennam Alexandrinam accedit, sed eam nullo modo aequat Senna Tripolitana, cujus folia elegantius sunt viridia, non adeo acuminata, et digito tentanti subhirsuta videntur; sunt majora, plane viridia, superius obtusa. Deterioris adhuc notae est Senna Italica et Gallica, cujus folia latiora et obtusiora, laetius virentia et magnis venis praedita, caeteris debiliora; saporis subdulcis sunt et glutinosi. Saepe cum Colutea arborescente Linn. adulterantur.

SERPENTARIA VIRGINIANA. Slangeurt. Virginische Giftwurzel.

Aristolochiae serpentariae, Linn. Cl. XX. ord. Hexandr., RADIX, e capite nodoso, fibroso praemorsa, in Virginia et Carolina habitans; coloris extus e gilvo viridescentis, intus pallide lutei; odoris fragrantis, gravis, e Valerianae Camphoraeque odore confusi; saporis acris pungentis.

SERPILLUM. Vild Thymian; Vor Frue Sengehalm. Quendel; Marien-Bettstroh.

Thymi Serpilli, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA florens, mense Junio et Julio colligenda. Suffruticulus in apricis et aridis habitat. Odorem habet fragrantem, gratumque; saporem aromaticum subamarum. Flor. Dan. Tab. 1165.

SEVUM BOVINUM. Oxetalg. Rindstalg.

SEVUM CERVINUM. Hiortetalg. Hirschtalg.

SEVUM OVILLUM s. VERVECINUM. Faaretalg. Schaaftalg.

Pinguedo solida ex omento et capsulis adiposis praesertim renalibus et lumbaribus horum animalium eliquata.

SILIQUA HIRSUTA. Klöende Bönne. Juckende Fasel; Kuhkrätze.

Dolichi prurientis, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., Legumina, ex utrisque Indiis advehuntur, coriacea, longitudine trium ad quinque pollicum, cras-

sitie digiti, extus setis rigidis e rubro fuscis undique obsita.

SIMARUBA. Simarube. Simarube; Ruhrrinde.

Quassiae Simarubae, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., CORTEX, e Guajana, Jamaica et aliis insulis Americae meridionalis advectus, tum trunco, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur, praestantior est, et fibris succisis distinguitur. Est coloris dilute gilvi, tenax et flexilis fere, ac sequax; saporis amaricantis et leniter adstringentis. Pars lignosa adhaerens, ut iners, abjiciatur; neque vetustior, lignosus et obscuri coloris cortex, servandus est.

SINAPIS. Sennep. Senf.

Sinapis nigrae et albae, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., SEMEN exiguum, globosum; odoris debilis; subamari, acris, fervidi. Planta annua, fera et hortensis, maxime in Anglia colitur.

SODA; NATRUM CARBONICUM. Soda. Soda; Glasschmalz; Aschsalz.

Soda Hispanica concrementum refert cinereum, e combustis plantis maritimis ortum. Natrum carbonicum elixando inde obtineri solet.

Soda Hungarica, quae nativa est, in Hungariae nonnullis lacubus siccatis sponte efflorescens, depuratione Natrum carbonicum praebet.

SOLANUM. Svineurt; Soebaer. Nachtschatten; Saukraut.

Solani nigri, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA recentia, mense Junio colligenda. Odorem habent foetidum; saporem herbaceum, subfatuum. Flor. Dan. Tab. 460.

SOLANUM FURIOSUM. Vid. *Belladonna*.

SOYMIDA. Soymidaträe. Soymidenbaum.

Swietenniae Soymidae s. febrifugae, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., CORTEX, in frustis variae magnitudinis subconvolutis ex India orientali allatus, crassus, durus, brunneo-rufus, externe cinerascens, interne cinereo-rufescens, fractura subfibrosa. Odor debilis, gratus; sapor primo adstringens, deinde amarus, diu inhaerens.

SPATUM PONDEROSUM; BARYTA SULPHURICA NATIVA. Tungspat. Schweerspat.

Sulphas Barytae est SAL medium terrestre, acido sulphurico et Baryta pura constans. In metallifodinis Hereyniae, Saxoniae aliisque, venas implet. Eligantur frustula alba, lamellosa, etherogeneis minus inquinata. Baryta acido sulphurico nupta, in aqua plane insolubilis est.

SPIGELIA ANTHELMIA. Amerikansk Ormeurt. Amerikanisches Wurmkraut oder Spigelie.

Spigeliae anthelmiae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX cum HERBA. Radix fibrosa. Caulis simplex erectus. Folia oblongo lanceolata, quaterna. Racemus terminalis. Odor nullus; sapor amaricans. Ex insulis Caribaeis adfertur.

SPIGELIA MARILANDICA. Marilandsk Ormeurt. Mariländisches Wurmkraut oder Spigelie.

Spigeliae marilandicae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX cum HERBA. Radix nodulosa, fibrosa. Caulis simplicissimus, obsolete tetragonus. Folia ovata, oblonga, sessilia, opposita, remota. Racemus terminalis. Odor et sapor, vasis lignei aqua corrupti. Ex America septentrionali advecta.

SPINA CERVINA. Vid. *Rhamnus catharcticus.*

SPIRITUS VINI. Brändeviin. Brandtwein.

Spiritus inflammabilis, destillatione e Vino, Vini foecibus, Cerealibus, Syrupo de Saccharo defluente etc., prolicitus. Ad Tincturas aliaque Medicamenta paranda, non nisi spiritus vini gallicus, isque probe rectificatus, adhibeatur.

SPONGIA. Svamp. Schwamm.

Spongia officinalis, Linn. Cl. VI. ord. Vermes, Zoophyta. Est habitaculum vermis ZOOPHYTI vel POLYPI cellulosum, in mari Mediterraneo et Rubro magna quantitate reperiundum album, vel coloris citrini, pluribus exiguis foraminibus pervium, elasticum, leve; odoris proprii minus grati; saporis expers.

SQUILLA s. SCILLA. Strandlög. Meerzwiebel.

Squillae maritimae, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn.,

RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa, intus albicans; odoris vix ullius; succo acri, glutinoso, peramaro dives; non decolor, neque attrita, neque defricata. In ora maris Mediterranei sponte provenit.

STANNUM. Tin. Zinn.

Stannum est omnium metallorum levissimum, parum tenax, facile malleabile, vix elasticum, molle, flexile; in acidis ac alcalibus solubile. Odor inter manus fricti, peculiaris, sapor metallicus. Cum Acido nitrico Oxydum album valde refractarium constituens.

STIBIUM. Vid. *Antimonium*.

STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM. Vid. *Antimonium*.

STORAX CALAMITA. Storax. Storax.

Styracis officinalis, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., GUMMI RESINA, e Syria et vicinis locis allata, cujus optima species, arundine excepta, Canulata vel Calamita dicta, rarissime prostat et valde pretiosa est. Nostris in officinis vulgo illa tantum species occurrit, quae e lignorum ramentis et ferragine, Styracis ope conglutinatis constat, et *Scobs Storacina* dicitur, cui vero styracis paucum inest, cum jam maximam partem expressa, pro conficienda Storace granulata, ad nos perveniat. Pro usu medico praeferenda Storax in granis, scil. lacrymis albicantibus, luteis, rubentibus, variegatis, suavéolentibus, compagis densae, in ore tenacibus pinguiusculis; saporis grati pungentis in grumos vel massas e flavo

rubroque fuscas coalitis, nullo tamen ferragine intertextis. Storax liquida vera, lacryma arboris nativa, ad nos non pervenit, sed e Storace, vino aut oleo soluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

STYRAX LIQUIDA. Styraxbalsom. Styraxbalsam.

Liquidambaris Styracifluae, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., LACRYMA resinosa, e nova Hispania et America septentrionali advecta. Quod in officinis Storacis liquidae titulo insignitum prostat, magna est, factitium, cinereo spadiceum aut pullum, opacum, unctuosum, e Terebinthinae oleo vinoque compositum, cui storacis siccae pauxillo addito, ambrosiacus ejus odor conciliatus fuit. Sincera et nativa Storax liquida, veteribus celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris Rubri insula Cobro, Moccamque adfertur, quo ipso loco rara est et praecara. Est vero pellucida, coloris rubelli aut e murino fulvi, et valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, et fragrantissima.

SUCCINUM, ELECTRUM; CARABE. Bernsteen; Rav. Bernstein.

Substantia bituminosa, flava et alba, e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Est densa et fragilis, propter suam duritiem tornari, caedi, et poliri sese sinit. Prunis injecta gratum dispergit odorem. Fractura splendens; insipidum; quando fricatur, attrahit corpora levia, et fit electricum. In aqua nullam habet solubilitatem, et spiritus vini exiguam

portionem Resinae extrahit. In aethereis et pinguibus oleis non solvitur, nisi pro parte in carbonem mutatum. Ex Iutia, Insula Moën, Prussia, Polonia et Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM s. VULGARE. Guul Svovl. Gelber Schwefel.

Comburendo oxygenio nuptum acidum sistit sulphuricum. Occurrit in Islandia, Italia, Hispania, Germania, Helvetia et aliis locis nativum. Recipi debet flavum in cylindris fusum, quod quidem *citrinum* dicitur, aut vivum aut in flores sublimatum. Est solidum, friabile, leni igne liquescens, colore rubro, ardens flamma coerulea vapore forti suffocante. Odor, nisi fricetur, nullus: accensus acidus, penetrantissimus; sapor, modo purum sit, nullus.

SWIETENIA MAHAGONI. Mahagoniträe. Mahagonibaum.

Swieteniae Mahagoni, Linn. Cl. X ord. Monogin., CORTEX, stratis alternantibus rubris et albidis variegatus, epidermide flavescente rugosa subcoriacea obductus. Odor debilis, subaromaticus. Sapor valde adstringens et amarus. Arbor procerus in insulis Indiae occidentalis copiose crescens.

Lignum ejusdem badium, durum, ponderosum; oderis vix ullius; saporis amaricantis.

T

TABACUM; NICOTIANA. Tobak. Toback.

Nicotianae Tabaci, Linn. Cl. V. ord. Monogyn.,

FOLIA probe sicca, flava, nondum contorta; saporis peramari, odoris subnauseosi. Exsiccata fuscum induunt colorem.

TACAMAHACA. Hak og Tak. Hack und Tack.

Fagarae octandrae, Linn. Cl. IV. ord. Monogyn., in Curacao Americae et in insula Francia crescentis, GUMMI RESINA aromatica, vel lutescens, vel e luteo viridescens, e cortice vulneratae arboris exsudans, et in pericarpiis cucurbitinis collecta. Odorem habet gratum, fragrantem, validum, in flores Lavendulae incidentem; saporem leniter amaricantem, nauseosum.

TAMARINDUS. Tamarindeträe. Tamarindenbaum.

Tamarindi indicae, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., ex siliquis deprompta PULPA, e fusco nigricans, viscida et quasi subpinguis, filamentis lignosis, seminibus compressis, duris, quadratis, spadiceis, splendidis permixta; saporis acidi vinosi, pungentis, parumque nauseosi, quibus notis facile a prunorum pulpa, ubi larga manu admixta fuerit, dignoscitur. Eligatur recens, tenax, spissa, et subrufo nigricans; saporis acrioris. Vitanda est, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit e superficie externa uda, seminibusque emollitis tumidulis, neque adeo splendentibus.

TANACETUM. Reinfan; Ormekrud; Tandsue; Raufan; Ringefan; Roskonge; Roud-Röllik. Reinfahren.

Tanaceti vulgaris, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., COMA florens, in aggeribus proveniens, mense Julio colligenda. Planta perennis; odorem habet fortem, gravem, acutum; saporem valde amarum aromaticum.

Ejusdem SEMEN. Reinfanfröe; Ormekrudfröe. Reinfahrensaamen; Gemeine Wurmsaat. Flor. Dan. Tab. 871.

Istud Semen cum Cinae semine et cum herba quoad odorem et saporem convenit.

TARAXACUM; DENS LEONIS. Lövetand; Prästekrone; Munkehoved; Fivel; Kabbelaup; Laxeerblomster. Pfaffenröhrlein; Löwenzahn; Löwenkraut; Hundeblumen.

Leontodi Taraxaci, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., HERBA. Planta perennis lactescens, ad vias et in pascuis vulgaris. Odorem nullum; saporem initio obscure dulcescentem, tum amarum habet. Herba omnis cum radice, recens in usum vocanda.

Ejusdem RADIX subfusiformis, ramosa, minimi digiti crassitie; extus subfusca, intus pallida; saporis amaricantis. Recens verno colligatur tempore. Flor. Dan. Tab. 514.

TARTARUS VINI. Viinsteen. Weinstein.

Succi baccarum vitis viniferae aliarumque plantarum SAL nativum, neutrum, acidulum, proprio acido et Kali constans. Spontaneo ex Vinis secessu obtinetur, a partibus extractivis et colorantibus, coctione cum argillis et crystallisatione mundatis; vocantur Crystalli tartari. Tartarus crudus albus est aut ruber. Praestat e Rhenano vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens.

THEREBINTHINA. Terpentin. Terpentin.

Est Balsamum resinosum naturale, coeteris resinis liquidis spissius, sponte vel e sauciato vel terebrato trunco arboris affluens, et pro arboribus, unde obtinetur, diversum.

TEREBINTHINA CANADENSIS, s. BALSAMUM CANADENSE. Kanadisk Terpentin eller Balsom. Kanadischer Terpentin.

Pini balsameae et Canadensis, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph. BALSAMUM omnium nobilissimum et praestantissimum, liquidum, pellucidissimum, albidum, aetate lutescens, in fila ductile; odoris balsamici, grati, ad balsamum Meccae accedentis; saporis mitis vix amaricantis. E Canada et aliis locis Americae septentrionalis adfertur.

TEREBINTHINA LARICINA, s. VENETA. Benedisk Terpentin. Benedischer Terpentin.

Pini Laricis, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BALSAMUM liquidum diaphanum, consistentiae mellis vel syrupi spissioris, pallide lutescens, tenax, in fila ductile; odoris subfragrantis; saporis amari, acriusculi, resinosi, faucibus inhaerentis. Ex Europa meridionali advectum.

TEREBINTHINA COMMUNIS. Gemeen Terpentin. Gemeiner Terpentin.

Pini sylvestris, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BALSAMUM omnium vilissimum, butyraceum, opacum, sordidum, pallidum; odoris et saporis valde ingrati; non raro impurum; pro usibus medicis non adhibeatur.

Per destillationem hujus Terebinthinae communis cum aqua sufficiente, obtinetur OLEUM TEREBINTHINAE liquidum, limpidum, colore aqueo, odore fragrante.

E vulnerato vel terebrato trunco hujus arboris vel pini abietis succus resinosus effluit, tempore hiemali rigescit, crustamque pallidam, cerae haud absimilem format, quae instrumento idoneo separatur, et super ignem lenem funditur, a sordibus purgatur, et RESINA COMMUNIS dicitur.

Si resina haec absque aqua super ignem modice coquatur, et postea coletur, COLOPHONIUM vocatur: sit fusco rubens, subdiaphanum, splendens, fragile, fractura plana nitente, odoris debilis pini, insipidum, pulveratum lutescens.

PIX LIQUIDA, s. NAVALIS, quae ex ramis et lignosis partibus hujus arboris, ope destillationis per descensum obtinetur, est oleum empyreumaticum spis-

siusculum, consistentiae mellis vel syrupi, nigro-rubicundum, subdiaphanum, in filum subductile, odoris balsamici fumosi, saporis pinguiusculi amaricantis.

Hoc oleum sub perpetua agitatione ad siccitatem coctum, est PIX NIGRA atra, lucida, fragilis, fractura vitriformis, in calore tenax, digitis fortissime adhaerens.

TERRA JAPONICA. Vid. *Catechu*.

THUS. Vid. *Olibanum*.

THYMUS VULGARIS. Thymian. Thymian.

Thymi vulgaris, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosp., HERBA aromatica suffrutex, in hortis colitur; colligenda mense Junio.

TILIA. Lindeträe. Lindenbaum.

Tiliae Europaeae, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., FLORES; recentes sunt e viridi albicantes; odoris suavis in flores Naphae incidentis, subdulcis, subnarcotici; saporis dulcis, subviscidi. Flor. Dan. Tab. 553.

TINCAL. Vid. *Borax*.

TRAGACANTHA. Tragant. Dragant.

Astragali gummiferi, Linn. Cl. XVI. ord. Decandr., ex Oriente Graeciaeque insulis advectum GUMMI, vermiculorum instar contortum, purum, candidum. Rejiciatur flavescens, obscurioris coloris, in massis impuris sordidis allatum, super linguam non deliquescens.

gyn., RADIX, in pratis depressis et humidis proveniens, praemorsa, annulis elevatis cincta, crassitie pennae anserinae, apicem versus fibrosa; fibris filiformibus, teretibus, descententibus; ex albido-fusco-cinerascens. Odor graveolens, foetidus, urinae felinae congruens; sapor amaro-acris, ingratus. Radices crassiores vel tuberosae, lignosae, fragiles, nigrescentes, rejiciantur. Cum subtilis radicis hujus virtus facile in auras avolet, a squalore liberata et probe sicca, in vase vitreo probe clauso arctissime compingenda, et loco sicco frigidoque servanda est. Flor. Dan. Tab. 570.

VANILLA. Vanille. Vanillie.

Epidendri Vanillae, Linn. Cl. XX. ord. Diandr., FRUCTUS s. Siliqua compressa, semipedem longa, calami scriptorii majoris crassitiei; coloris ex atro fusci; odoris grati, saporis aromatici, pulpam seu medullam, cum minutissimis acinis pinguem continens. Ex America et inprimis nova Hispania advehitur. Eligendae sunt siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici odoris atque saporis.

VERBASCUM. Kongelys; Stodderlys. Wollkraut; Königskerzen.

Verbasci Thapsi, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FLORES, in glareosis, sterilibus crescentes, mensibus Julio et Augusto colligendi. Saporem habent melleum, odorem suavem. Flor. Dan. Tab. 631.

VERONICA. Veronica; Aerenpriis; Barsleit; Flesmegräs; Norsk Thee. Ehrenpreis.

Veronicae officinalis, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA. Caulis decumbens filiformis, teres, subsimplex, pubescens. Folia ovali-oblonga, ferrata, pubescentia, subsessilia. Odor debilis; sapor amaricans, subadstringens. In sylvis, dumetis, et ericetis habitat. Flor. Dan. Tab. 248.

VINCETOXICUM. Vid. *Hirundinaria.*

VINUM. Viin. Wein.

Vitis viniferae, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., ex uvis SUCCUS expressus, calore temperato fermentatus, et a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praesto sint: VINUM GALLICUM ALBUM vetustius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis aut Myrtilli baccis non imbutum; LUSITANICUM *Oporto* dictum; HISPANICUM, uti et MADERENSE et MALLACENSE, nobilius; RHENANUM vetustius, gratum, non acidi crudique saporis. Syruporum aut mellis cum vino commixtio, noto cognoscitur experimento, ubi vino repletum angustioris colli vitrum, super vas aquam continens invertitur, unde dulcem aqua nanciscitur saporem. Deleteria vero illa, a praeparatis saturninis; Bismutho, ipsoque Arsenico vino inducta labes detegitur immisto liquore vini probatorio in Parte II descripto; quo Vinum adulteratum nigricantem aut subflavum induit colorem: vel vinum ad siccitatem evaporatur, et tunc residuum metallum detegitur.

VIOLA MARTIA. Martsfioler. Blaue Märzviolen.

Violae odoratae, Linn. Cl. XXI. ord. Monogam., FLORES, in aggeribus atque vallibus frequentes: flores intense coerulei; odoris gratissimi, specifici; saporis mucilaginosi, amaricantis. Flor. Dan. Tab. 309.

VIOLA TRICOLOR, JACEA. Stedmodersblomst; Flöielsurt; Stifmorsblom; Souloubat. Stiefmütterchen; Freysamkraut; Dreyfaltigkeitsblume.

Violae tricoloris, Linn. Cl. XIX. ord. Monogam., HERBA, in hortis et arvis sponte proveniens; caule triquetro, diffuso; foliis ovatis oblongis, crenulato-dentatis, petiolatis; stipulis pinnatifidis; odore subnullo; sapore mucilaginoso, subamaricante. Flor. Dan. Tab. 623.

VIRIDE AERIS. Vid. *Aerugo*.

VITIS IDAEA. Tyttebär; Krösingbär; Kröslinger; Tytebär; Tytling. Preiselbeeren; Kranbeeren.

Vaccinii Vitis Idaeae, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., FRUCTUS, e Norvegia ad nos pervenientes, passim quoque in Dania occurrunt. Saporis validi, aciduli, subacerbi. Flor. Dan. Tab. 40.

VITRIOLUM ALBUM; ZINCUM SULPHURICUM. Huid Vitriol. Weiszer Vitriol; Gallizenstein; Augenstein.

Apud Goslarienses paratum, SAL metallicum, ex Zinco ed Acido sulphurico, solutione repetita et crystallisatione conflatum. Cum raro purum et album

sit, in aqua solvendum, cum Zinco granulato coquendum, filtrandum et crystallisandum est. Saporem ingrate acrem, adstringentem habet.

VITRIOLUM COERULEUM; VITRIOLUM DE CYPRO; CUPRUM SULPHURICUM. Blaae Vitriol. Blauer Vitriol.

Sal passim ex gleba cupri pyritosa, sive aes cum sulphure calcinando paratum. Saporis est nauseoso-acris, valde styptici.

VITRIOLUM MARTIS, s. VIRIDE; FERRUM SULPHURICUM. Grön Vitriol; Jernvitriol. Grüner Vitriol; Eisenvitriol.

Sal crystallisatum ex Hungaria, Germania et Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admixtum prodit immissa lamina ferrea pura, cui cuprum adhaeret. Existit nativum, vel arte paratur e terris et Schistis hoc sale gravidis, potissimum ex Pyritibus fatiscentibus atque ustulatis. Saporis est adstringentis.

Z

ZINCUM. Zink; Spiauter; Tutenage. Zink.

Est METALLUM lamellosum, ex albido coerulescens, subtenax, malleo parum obediens. Ignitum sub aëris accessu flammam viridem concipiens, abit in Oxydum album, partim sub flocculorum levissimorum forma avolat. Chinense plerumque puritate

antecellit illo, quod in officinis metallurgicis Goslariensibus producitur.

ZINCUM SULPHURICUM. Vid. *Vitriolum album.*

ZINGIBER. Ingever. Ingwer.

Amomi Zingiberis, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX, ex Indiis advecta, tuberosa, compressa, rugosa, lobata, lobis varie figuratis, obtusis, nodulosis; extus pallide cinerea, intus albida; odoris subaromatici; saporis valde acris, subaromatici. Eligatur ponderosa, minus fibrosa, non cariosa.

PARS SECUNDA

COMPOSITA ET PRAEPARATA

ACETUM AROMATICUM

(*Loco Aceti bezoardici et prophylactici*)

Recipe. Herbae Absinthii,
Roris marini,
Salviae,
Menthae piperitae,
singularum uncias duas,
Cassiae cinnamomeae unciam dimidiam,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
singularum drachmas duas,
Aceti crudi libras octo.

Post sufficientem macerationem in vase vitreo supra arenam tepidam, exprime et cola.

ACETUM CONCENTRATUM

(*Loco Aceti per frigus concentrati*)

R. Kali carbonici uncias sedecim,
Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam saturationem,

evaporent ad uncias quadraginta, quibus in retortam vitream immissis, adde

Acidi sulphurici concentrati uncias duodecim,

Aquae fontanae unciis octo dilutas.

Retortae collum ablue cum

Aquae destillatae unciis quatuor.

Tum adaptato recipiente et juncturis munitis, fiat destillatio ad siccum.

ACETUM DESTILLATUM.

R. Aceti Vini Gallici quantum libet.

Destilletur e retorta vitrea, aut e cucurbita cuprea stanno obducta munitaque capitello, una cum canali refrigeratorio e stanno puro parato, lento igne. Prodit primo Phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur, Acetum est. Continuetur Destillatio, donec e duodecim vel quindecim libris vix sesquilibra supersit, ne Aceto ad siccitatem abstracto, empyreuma contrahatur.

ACETUM PROPHYLACTICUM

Vid. *Acetum aromaticum*.

ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum quantum libet,

Aveti Vini destillati octuplum ponderis.

Misce, in vase bene obturato digerantur frigide per octiduum circiter. Postea colentur et fortiter exprimantur.

ACETUM LITHARGYRII

Vid. *Acetum Saturninum*.

ACETUM RUBI IDAEI.

R. Succi fructuum Rubi Idaei maturorum expressi, libras duas,
Aceti Vini Gallici Mensurae quadrantem.
Committantur vase vitreo et stent per biduum. Exprimantur fortiter, Colaturae addatur
Sacchari albi libra una cum dimidia.
Leni igne pro servando colore digeratur. Deinde frigefiat, subsideat et caute decantata committatur lagenis vitreis, probe obturandis.

ACETUM SATURNINUM

(*Acetum Lithargyrii*)

R. Minii purissimi partem unam,
Aceti vini partes quatuor
in vase figulino probe vitreato, coquantur lente igne, ad dimidiae partis consumtionem, sub continua cum spathula lignea agitatione, et per chartam filtrentur.

ACETUM SATURNINUM CONCENTRATUM.

(*Balsamum saturni, Extractum saturni*)

Evaporatione aceti saturnini ad quartae partis consumtionem in vase figulino vitreato paratur.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae uncias octo,
Minutim incisis affundantur
Aceti Vini Gallici optimi librae octo.
Per octiduum in vase vitreo digerantur, deinde colentur.

ACIDUM BENZOICUM

(*Flores benzoës*)

R. Benzoës pulveratae uncias viginti quatuor,
Natri carbonici crystallisati uncias octo.
Misce, et decoque ex
Aquae communis libris sedecim,
perpetue agitando, per horam dimidiam. Cola. Benzoën residuam denuo ex
Aquae communis libris sex
decoque, et cola. Colaturam cum priori misce et evapora, donec supersint librae duae. Filtra, et Acido sulphurico diluto satura.

Acidum benzoicum, sub forma pulveris levioris, ex cinereo albidi praecipitatum, in aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem cola per linteum, et ad crystallisandum sepone. Crystallos collectas, aqua frigida ablutas, sicca et serva.

ACIDUM CITRICUM.

R. Succi citri expressi, quantum vis,
stet per aliquot dies et filtretur. In vas vitreum immisso sub perpetua ebullitione sensim adjiciatur
Cretae purae pulveratae
quantum sufficit ad perfectam saturationem. Vas ab igne remotum seponatur per horam, et liquor supernatans decantetur. Cretae citricae residuae, aqua frigida ablutae et siccatae addatur
Acidi sulphurici dimidia pars,
Aquae communis partibus sex diluti.
Digerantur per horas viginti quatuor. Liquor acidus

decantetur, et calcaria sulphurica residua abluatur, donec insipida fiat. Liquores acidi commisti evaporent in vase porcellaneo ad consistentiam Syrupi; refrigerati filtrentur, et in crystallos redigantur, quae siccatae serventur.

ACIDUM MURIATICUM

(*Spiritus salis acidus*)

R. Natri muriatici libras sex,
in retortam vitream capacem immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati libras quatuor, caute antea dilutas cum
Aquae oommunis libris totidem.
Adaptato vase recipiente amplo, cui insint
Aquae destillatae librae duae,
et juncturis clausis fiat destillatio, igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum. Liquidum elicitum supra
Natri muriatici libram dimidiam,
rectifica.

ACIDUM MURIATICUM OXYDATUM

(*Acidum salis dephlogisticatum*)

R. Natri muriatici uncias duodecim,
Magnesii oxydati nativi uncias quatuor,
in retortam vitream tubulo munitam immissis affunde
Acidi sulphurici uncias sex,
dilutas antea caute
Aquae communis unciis totidem.
Applicato tubo recurvato sub aqua ducto, et jun-

cturis probe clausis, ope ignis remissioris eliciatur Gas, in lagenis vitreis aqua frigida impletis excipiendum, usque dum in his tertia tantum aquae pars remaneat, cui quassando jungendum. In vase rite clauso servetur loco frigido.

ACIDUM NITRICUM CONCENTRATUM

(*Spiritus nitri fumans*)

R. Kali nitrici pulverati libras quatuor,
in retortam vitream satis capacem, siccam, calefactam immissis affunde successive et caute, ope infundibuli vitrei tubo muniti

Acidi sulphurici concentrati libras duas.

Adaptetur vas excipiens amplum, tubulatum, vel tubus vitreus inter vasorum juncturas.

Fiat destillatio igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum.

ACIDUM NITRICUM TENUE

(*Spiritus nitri acidus*)

R. Kali nitrici pulverati libras octo,
in retortam vitream satis capacem immissis affunde

Acidi sulphurici concentrati libras quatuor, dilutas antea caute

Aquae communis libris totidem.

Applicetur excipulum amplum, cui

Aquae destillatae librae quatuor

antea sunt immissae.

Fiat destillatio ex arena, igne primum remissiori, sub finem pedetentim aucto ad siccum.

Acido elicito instilla

Argentum nitricum solutum,

quamdiu inde fit turbidum. Seponatur per aliquot dies. Tum liquorem limpidum decanta, et ex retorta fere ad siccum destillando, rectifica.

ACIDUM PHOSPHORICUM.

R. Ossium ad albedinem ustorum libras tres, subtilissime pulverisatis adde

Acidi sulphurici concentrati libras duas,

Aquae communis libris quindecim

dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebete stanneo, sub continua agitatione. Cola cum expressione, et liquorem ad mollis spissitudinem evapora. Residuum in aqua iterum solutum et colatum, cum

Ammonio carbonico

perfecte satura. Liquidum filtratum, et ad siccum evaporatum, praebet Ammonium phosphoricum; e quo, retortae vitreae satis amplae, aut vasi porcellaneo profundo commisso, Ammonium leni calore expellatur. Postquam spumescere cessavit, Acidum phosphoricum restans, igne modice aucto, adhuc per aliquot temporis momenta lente fluens detineatur; refrigeratum in triplo Aquae destillatae solvatur, et liquor filtratus limpidus servetur.

ACIDUM SUCCINICUM

(*Sal succini*)

R. Succini contusi, quantum vis.

Fiat destillatio, igne gradatim aucto. Prodibunt una cum oleo primum flavo, dein rubro, Liquor

acidulus, et Sal concretum; quibus addatur Aquae calidae sufficiens quantitas, ad Sal solvendum. Liquor acidus ab oleo separatus leniter evaporet, filtretur, et ad crystallisandum seponatur. Crystalli collectae depurentur solutione in aqua calida, et crystallisatione repetita.

ACIDUM SULPHURICUM CONCENTRATUM RECTIFICATUM

(*Oleum vitrioli*)

R. Acidi sulphurici venalis uncias duodecim, e retorta vitrea ampla destilletur, et in vitris probe clausis usui asservetur.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM

(*Spiritus vitrioli*)

R. Acidi sulphurici concentrati partem unam, cum Aquae destillatae partibus sex caute et gradatim misceatur.

ACIDUM TARTARICUM

(*Sal essentiale Tartari*)

R. Cretae pulveratae, et Aqua calida
saepius ablutae libras duas,
Aquae communis ferventis libras viginti quatuor,
in lebetem stanneum immissis adjiciantur sensim
Tartari depurati librae septem, vel quantum ad saturationem sufficit. Vase ab igne remoto stent per horae dimidium, dein in vas vitreum caute trans-

fundentur. Liquor limpidus supernatans Kali tartaricum continens decantetur, et residuum, aquam bis vel ter affundendo, abluatur. Huic residuo addantur

Acidi sulphurici diluti librae quatuordecim.

Spatula lignea saepius agitando, digerantur per horas viginti quatuor. Liquor acidus decantetur, et calcaria sulphurica residua aqua abluatur, donec insipida redeat. Liquores acidi commisti evaporent in vase vitreo aut porcellaneo, ad punctum fere crystallisationis, et fervidi per filtrum colentur. Post refrigerationem liquor a calcaria sulphurica per linteum separetur, et lenissimo calore crystallisetur. Crystalli tandem post repetitam evaporationem collectae, loco sicco serventur.

Nota. Ut cognoscatur, an filtrato huic liquori inhaereat Acidum sulphuricum, pauxillo hujus adduntur aliquot guttulae aceti saturni, ubi se prodit albido sedimento. Si liquor aliquot guttularum acidi nitrici affusione limpidus fit, acidum est purum, sin contra, inquinatus est acido sulphurico: in quo casu denuo illi addatur debita copia calcariae tartaricae.

AETHER ACETICUS

(*Naphtha Aceti*)

R. Natri acetici siccati uncias octo,
in retortam vitream immissis affunde
Miscellam, praevio paratam ex
Acidi sulphurici concentrati unciis quatuor, et
Spiritus vini rectificatissimi unciis sex.

Vasorum juncturis probe clausis, fiat destillatio leni igne. Liquori destillato adde

Liquoris Kali caustici diluti, quantum requiritur ad separationem Aetheris promovendam: Aetherem blando calore rectifica, et in vase probe clauso usui serva.

AETHER ACETICUS MARTIALIS

Vid. *Tinctura ferri acetici aetherea.*

AETHER PHOSPHORATUS

(*Naphtha phosphorata*)

R. Phosphori dissecti grana octo,
leni calore solve in
Aetheris sulphurici uncia una,
et in vitro probe clauso serva.

AETHER SULPHURICUS

(*Naphtha vitrioli*)

R. Acidi sulphurici concentrati,
Spiritus vini rectificatissimi,
partes aequales.

Caute mixta destillentur in retorta vitrea tubulata, balneo arenae vel cineris, quousque nihil sulphurosi odoris ascenderit. Residuo iterum adde

Spiritus vini rectificatissimi partem dimidiam, fiat destillatio, uti antea, quae operatio, cum simili Spiritus vini quantitate, bis adhuc potest repeti. Liquori aethereo bis destillationibus obtento adde

Aquae communis partem quartam,

Liquoris Kali caustici partem unam.
Aether supernatans e reliquo fluido separetur et calore blandissimo rectificetur.

AETHIOPS ANTIMONIALIS

Vid. *Hydrargyrum stibiato-sulphuratum.*

AETHIOPS MINERALIS

Vid. *Hydrargyrum sulphuratum nigrum.*

ALCALI VEGETABILE AËRATUM

Vid. *Kali carbonicum.*

ALCALI VOLATILE SICCUM

Vid. *Ammonium carbonicum.*

ALOË DEPURATA

(*Extractum Aloës gummosum*)

R. Aloës socotrinae libram unam.
Solvatur in
Aquae fontanae calidae libris quinque.
Committatur Solutio vasi vitreo per unum, alterumque diem, ut resinosa substantia cum faecibus fundum petat. Tunc clarum, a spisso per decantationem atque colationem separatum, lento igne in aheno ferreo ad Extracti consistentiam evaporet.

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi, quantum libet.
In olla fictili nova aut ferrea, ita capaci, ut ad tertiam modo partem repleatur, inter prunas calci-

netur, donec totum efferbuerit, neque spumam amplius emittat, sed leve, siccum atque porosum evaserit.

AMMONIUM CARBONICUM

(*Alcali volatile siccum*)

R. Ammonii muriatici pulverati sicci libram unam,
Cretae purae pulveratae libras duas,
mixta in retorta collo brevi, excipulo vero amplo munita, sublimentur. Sublimatum in vitris bene clausis asservetur.

AMMONIUM CARBONICUM PYRO-OLEOSUM

(*Sal volatile Cornu Cervi*)

R. Cornuum Cervi vel aliorum Ossium contusorum, quantum vis.
Immitte in retortam tubulatam ferream aut figulinam, et adaptato excipulo amplo cum tubo intermedio, igne aperto gradatim aucto fiat destillatio; adscendunt Liquor ammonialis, Ammonium concretum, et Oleum foetidum. Oleo separato, Sal et Liquor cum duplo cretae pulveratae siccae mixtus e retorta vitrea sublimetur, et sublimatum in vase rite obturato servetur.

AMMONIUM MURIATICUM DEPURATUM

(*Sal Ammoniacum depuratum*)

R. Sal Ammoniacum crudum solvatur in Aquae calidae quintuplo, in vase figulino vel stanneo. Filtrata

solutio evaporetur ad pelliculam et in calla reponatur, ut concrescant Crystalli.

AMMONIUM MURIATICUM MARTIATUM

(*Flores salis ammoniaci martiales*)

R. Ferri puri unciam unam,
solve in quantitate sufficienti
Acidi muriatici.
Soluto admisce
Ammonii muriatici uncias duodecim.
Massa leni calore exsiccata et contrita, in cucurbita sublimetur. Sublimatum conteratur, et in vase clauso servetur.

ANIMA RHEI

Vid. *Tinctura Rhabarbari aquosa.*

ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM

Vid. *Stibium sulphuratum nigrum laevigatum.*

ANTIMONII BUTYRUM

Vid. *Liquor Stibii muriatici.*

ANTIMONII VITRUM

Vid. *Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.*

AQUA AËRIS FIXI s. AËRATA

Vid. *Aqua carbonata.*

AQUA ANISI.

R. Seminis Anisi vulgaris partem unam.

Contusum Semen maceretur per noctem in
Aquae fontanae partibus novem.
Mane destillentur inde partes sex.
Eodem modo destillatur
AQUA FOENICULI,
PETROSELINI.

AQUA ANTHOS COMPOSITA

(*Aqua Hungarica*)

R. Florum Anthos libram unam,
Lavendulae uncias quatuor,
Spiritus Vini Gallici libras sex.
Digerantur per noctem et destillentur inde librae tres.

AQUA BENEDICTA RULANDI

Vid. *Vinum stibiatum.*

AQUA CALCARIAE USTAE

(*Aqua calcis*)

R. Calcariae purae recenter exustae partem unam,
Aquae fontanae partes octo.
Finita effervescentia, Liquor lacteus in vase clauso servetur, et post terrae subsidentiam in aliud vitrum decantetur, probe claudendum.

AQUA CARBONATA

(*Aqua aëris fixi*, *Aqua aërata*)

Immitte aquam fluviatilem in apparatum vitreum

a Doctore Nooth inventum (vel alium quemcunque huic scopo proprium) et gas acidum carbonicum, ex creta vel alia calcaria carbonica, mediante acido muriatico elicitum, transire coge, usquedum eo saturata sit. Aquam sic paratam in vasis probe clausis usui serva.

AQUA CARMELITANA s. AQUA MELISSAE COMPOSITA.

R. Foliorum Melissae recentium libram unam cum dimidia,
Flavedinis Corticum Citri uncias quatuor,
Nucis Moschatae,
Seminis Coriandri,
singulorum uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi acuti,
singulorum unciam unam.
Incisis et contusis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae sex,
Aquae Melissae librae tres.
Digerantur per triduum; dein destillatione prolicientur librae sex.

AQUA CERASORUM.

R. Cerasorum recentium partem unam.
In mortario lapideo cum nucleis probe contusis, addantur
Aquae purae librae sex.
Destillentur inde librae quatuor.

Eadem norma paratur:

AQUA RUBI IDAEI.

AQUA CINNAMOMI SIMPLEX.

R. Cinnamomi acuti partem unam,
Aquae fontanae partes novem.
Macerentur per diem unam aut alterum; dein destillentur inde partes sex.

Loco cinnamomi corticis adhiberi possunt Clavelli cinnamomi, utpote vilioris pretii.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

R. Aquae Cinnamomi simplicis,
Spiritus Vini rectificati,
singulorum partes aequales.
Misceantur.

AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

Destillent Aquae communis duae tertiae partes, rejecta prima stillantis aquae portiuncula.

AQUA FORTIS

Vid. *Acidum nitricum tenue.*

AQUA HUNGARICA

Vid. *Aqua Anthos.*

AQUA KALINA CARBONATA

(*Aqua mephitico-alcalina*)

R. Aquae carbonatae libram unam,
Kali carbonici drachmas duas.
Mixta in lagena vitrea bene obturata, loco frigido serva.

AQUA LAXATIVA

Vid. *Infusum Sennae compositum.*

AQUA LAURO-CERASI.

R. Foliorum recentium Lauro-Cerasi libras duas,
Aquae communis, quantum satis.
E retorta vitrea destillando elice libras tres, serva sollicite.

AQUA MELISSAE.

R. Herbae Melissae siccatae libras duas,
Aquae communis, quantum sufficit.
Destillando elice libras viginti.
Eadem ratione destillentur
AQUA MENTHAE CRISPAE,
PIPERITIDIS,
SAMBUCI.

AQUA MELISSAE COMPOSITA

Vid. *Aqua carmelitana.*

AQUA MEPHITICO-ALCALINA

Vid. *Aqua Kalina carbonata.*

AQUA ROSARUM.

R. Florum Rosarum recentium, sive, si hi deficiant, sale conditorum, partem unam,
Aquae fontanae partes sex.
Leni destillatione inde proliciantur partes tres.
Ad eandem normam paratur
AQUA FLORUM AURANTII s. NAPHAE.

AQUA SATURNINA.

R. Aquae destillatae libras duas,
Spiritus Vini unciam dimidiam,
Aceti Saturni unciam unam.
Mixta serventur in vase vitreo.

AQUA SULPHURATO-ACIDULA

(*Liquor probatorius Hahnemanni*)

R. Calcariae sulphuratae,
Acidi tartarici, singulorum drachmas duas,
Aquae destillatae uncias sedecim.
In vitro clauso mixta agitentur quassando. Postquam subsederint, Liquor limpidus decantetur in vasis vitreis quatuor, cui unicuique
Acidi tartarici drachma una insit.
Obturentur statim.

ARCANUM DUPLICATUM

Vid. *Kali sulphuricum.*

ARGENTUM NITRICUM FUSUM

(*Lapis infernalis*)

R. Argenti purissimi, quantum placet. Solve in
Acidi Nitrici quantitate sufficiente,
deinde leni calore solutio ad siccum evaporetur.

Massa in crucibulo argenteo aut porcellaneo calore leni liquatur, usquedum Olei instar fluat; subito effundatur in modulum ferreum calefactum, sevo illitum; refrigeratam massam in vitro clauso serva.

BALSAMUM CEPHALICUM s. APOPLECTICUM.

R. Olei Nucis Moschatae expressi unciam unam, immisceantur
Olei Caryophyllorum,
Lavendulae,
Rorismarini, ana semidrachma,
Succini scrupulus dimidius,
Balsami Peruviani drachma una.
Nota. Qui velit, addet Moschi cum spiritu vini triti, grana decem.

BALSAMUM COMMENDATORIS

Vid. *Tinctura Benzoës composita.*

BALSAMUM EMBRYONUM

Vid. *Spiritus aromaticus.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM

Vid. *Unguentum Hydrargyri rubrum.*

BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus Vini rectificati libras quatuor,
Saponis albi Hispanici uncias decem,
leni igne ad solutionem digestis addantur
Camphorae tritae unciae duae,
Olei Rorismarini,
Origani, singulorum semiuncia.
Misceantur agitando.

BALSAMUM SATURNI

Vid. *Acetum saturninum concentratum.*

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Sulphuris puri partem unam,
Olei Lini partes quatuor,
coquantur in vase terreo satis capaci, arena circumdato, lenissimo igne, spathula continue agitando, ad consistentiam Balsami spissioris.

Nota. BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM obtinetur, si simplicis parti unae olei terebinthinae partes octo addantur;
BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM vero, si simplici eodem modo admiscetur olei anisi quintuplum.

BALSAMUM TEREBINTHINATUM s. UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinae laricinae drachmas duas,
Cerae citrinae drachmam unam cum dimidia.
Leni calore colliquefactis addantur
Olei Terebinthinae drachmae duae.
Misceantur.

BALSAMUM TRAUMATICUM

Vid. *Tinctura Benzoës composita.*

BALSAMUM UNIVERSALE.

R. Olei Raparum recenter expressi libram unam cum dimidia,
Cerae citrinae semilibram,
invicem solutis et frigefactis addantur sub continua agitatione,

Balsami Saturni unciae tres.

Nota. Si desideretur, addi possunt

Camphorae drachmae quatuor cum dimidia.

BALSAMUM VITAE EXTERNUM.

R. Saponis Hispanici siccati et triti,
Olei Terebinthinae, singulorum libram unam,
Salis Tartari uncias duas.
Misceantur.

BALSAMUM VITAE AD MODUM HOFMANNI.

R. Olei Lavendulae,
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi,
singulorum scrupulum unum,
Succini rectificati guttas decem,
Balsami Peruviani drachmam dimidiam,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias decem.
Tingantur radice Alkannae, committantur digestioni frigidae, et filtrentur per gossypium.

BARYTA MURIATICA

(*Terra ponderosa salita*)

R. Barytae Sulphuricae nativae electae et laevigatae partem unam,
Kali Carbonici partes duas.
Coquantur per horam in lebete stanneo cum tribus ad quatuor partibus aquae communis, sub perpetua agitatione spathula lignea, aquam evaporatione con-

sumtam subinde restituendo; et diluta filtrentur. Baryta carbonica obtenta, et probe abluta, lege artis in acido muriatico solvatur. Liquor filtratus evaporetur ad perfectam siccitatem; massa residua in crucibulo excandescat. Refrigeratam et pulveratam aqua fervida solve, et Liquorem filtratum cum pauco Barytae carbonicae digere. Denuo filtratum in crystallos redige, quae, antequam siccentur, aqua destillata frigida abluantur.

BORAX TARTARISATA

Vid. *Tartarus boraxatus.*

BUTYRUM ANTIMONII

Vid. *Liquor Stibii muriatici.*

BUTYRUM CACAO

Vid. *Oleum Cacao.*

BUTYRUM MAJORANAE.

R. Foliorum Majoranae recentium libram unam, contusa coquantur lenissimo igne cum
Butyri recentis insulsi libra una.
Consumta humiditate colentur et exprimantur. Paulo refrigeratis addatur
Olei destillati Majoranae semidrachma.

CALCARIA SULPHURATA

(*Hepar Sulphuris calcareum*)

R. Calcariae ustae pulveratae uncias duas,
Sulphuris unciam unam;
mixtis sensim affunde

Aquae fervidae libram unam,
Leni igne, frequenter agitando evaporent ad siccum.
Massam siccam in vase vitreo clauso usui serva.

CARBO PRAÉPARATUS

(*Pulvis carbonum*)

Carbones lignei urantur in vase clauso foraminulo instructo, ut partes omnes ope ignis volatiles abigantur, vel usque dum fumus desinit. Carbo remanens in pulverem tritus servetur vase clauso.

CARBO SPONGIAE

(*Spongia usta*)

E Spongia marina mundata eodem modo Carbo est parandus.

CERA AD LABIA.

R. Cerae albae drachmas duas,
Spermatis Ceti drachmas tres,
Olei Amygdalarum recentis drachmas sex.
Colliquatis leni calore addatur
Radicis Alkannae spuriae, grossiuscule contusae, drachma una cum dimidia.
Aliquoties ebulliant, deinde ab igne removeantur, colentur, et additis
Olei Lavendulae guttis triginta,
probe mixta effundantur in capsulas papyraceas, quae refrigerio committantur.

CERA VIRIDIS.

R. Cerae citrinae libram unam,
Resinae Pini uncias sex,
Terebinthinae uncias quatuor,
Viridis Aeris triti semiunciam.
Liquentur invicem, colentur et effundantur more solito.

CERATUM SATURNI.

R. Olei Nucum Juglandum unciam unam,
Cerae citrinae uncias quatuor,
liquescant leni igne et addantur
Aquae fontanae unciae duodecim,
Extracti Saturni uncia una,
misceantur exactissime et fiat ceratum.

CEREOLI SIMPLICES

(*Cereoli exploratorii*)

R. Cerae flavae uncias sex,
Olei Olivarum unciam unam.
Leni calore liquefactis et ab igne remotis immerge telas linteas tenues, ex quibus lege artis fiant convolvendo cereoli, superficie laevi et forma exacta.

CHALYBS PRAEPARATA

Vid. *Ferrum pulveratum.*

CINERES CLAVELLATI DEPURATI

Vid. *Kali carbonicum.*

CONSERVA ROSARUM.

Flores Rosarum recentes a Calycibus liberati, duplici pondere Sacchari albissimi in mortario lapideo cum pistillo ligneo triturentur, et in conservam redigantur.

CORNU CERVI SINE IGNE PRAEPARATUM.

Cornua Cervorum in majora frustra secta coquantur in aqua fontana, donec mollescant. Medulla et cortex nigricans cultro separetur, cornua iterum abluta siccentur, et in mortario ferreo in subtilissimum redigantur pulverem.

CREMOR TARTARI SOLUBILIS

Vid. *Tartarus boraxatus.*

DECOCTUM LAXATIVUM

Vid. *Infusum Sennae compositum.*

ELECTUARIUM APERIENS.

R. Pulpae Tamarindorum drachmas sex,
Foliorum Sennae in pulverem redactorum drachmas tres,
Kali tartarici drachmam unam cum dimidia,
Syrupi de Manna unciam unam cum dimidia,
Misceantur.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

R. Radicis Sarsaparillae uncias tres,
Ligni Guajaci unciam unam,
Foliorum Sennae unciam unam cum dimidia,

Rhabarbari drachmas duas,
Corticis Sassafras,
Seminis Anisi, singulorum drachmam unam.
In pulverem trita, redigantur in Electuarium cum Mellis despumati libra una.

ELECTUARIUM THERIACA.

R. Radicum Angelicae uncias sex,
Serpentariae Virginianae uncias quatuor,
Valerianae majoris,
Scillae,
Cassiae Cinnamomeae, singularum uncias duas,
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphuriei,
Opii, singulorum unciam unam,
Mellis despumati libras sex,

Melli paululum calefacto addatur Opium, vini Hispanici quantitate sufficiente dilutum; deinde admisceantur caetera in pulverem trita.

Nota. Quaelibet uncia Theriacae hujus continet Opii grana circiter quinque.

ELAEOSACCHARUM ANISI.

R. Sacchari albissimi unciam unam,
Olei Anisi guttas octo.

Terendo fiat Elaeosaccharum.

Eodem modo parantur:

ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI,
CITRI,
FOENICULI,
MENTHAE PIPERITAE,

et reliqua.

ELIXIR ACIDUM.

R. Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor.
Sensim et guttatim instilletur
Acidi sulphurici pars una, adde
Coccinellae, quantum sufficit ad Tincturam saturandam.
Digesta per triduum filtrentur.

ELIXIR AROMATICUM ACIDUM
(*Elixir Vitrioli Mynsichti*)

R. Essentiae aromaticae libram unam,
instilla
Acidi sulphurici concentrati unciam dimidiam.

ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM AD MODUM HOFMANNI.

R. Flavedinis Corticum Aurantiorum recentium,
Corticis Peruviani optimi, singulorum unciam dimidiam,
Extracti Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Myrrhae electae, singulorum drachmas duas,
Salis Tartari unciam dimidiam.
Incisis et contusis affundatur
Vini Canariensis libra una.
Per triduum digesta decantentur.

ELIXIR PAREGORICUM LONDINENSE.

R. Acidi Benzoïci,
Opii, singulorum drachmam unam,
Camphorae Scrupulos duos,
Olei Anisi drachmam dimidiam,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti quatuor.
Mixta digere leni calore et cola.

Nota. Quaelibet uncia Opii circiter grana duo continet.

ELIXIR PECTORALE,

VULGO REGIS DANIAE SEU RINGELMANNI.

R. Extracti Liquiritiae uncias sex,
Aquae Foeniculi libram unam,
Seminis Anisi contusi unciam unam,
Liquoris Ammonii vinosi libras tres.
Per viginti quatuor horas digesta colentur.

ELIXIR VITRIOLI AD MODUM MYNSICHTI

Vid. *Elixir aromaticum acidum.*

EMPLASTRUM ADHAESIVUM

(*Emplastrum Anglicum*)

R. Ichthyocollae optimae minutim incisae unciam unam,
Benzoës drachmam unam,
Spiritus vini uncias duodecim,
immissa cucurbitae coquantur usque dum omnia fuerint dissoluta. Solutio colata adhuc fervida ope

penicilli magni et mollis oblinetur panno serico tenso. Secundum non inducatur stratum, antequam primum fuerit exsiccatum. Eadem sub cautela fiat iteratio stratorum, usque dum emplastrum requisita crassitie gaudeat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM

Vid. *Emplastrum Cerussae.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Ammoniaci, quantum libet,
solvatur in
Aceti Vini, sufficienti quantitate.
Inspissetur ad consistentiam Emplastri et servetur.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO CUM ASA FOETIDA.

R. Ammoniaci uncias viginti quatuor,
Asae foetidae uncias octo,
Saponis Hispanici rasi uncias quatuor,
Olei olivarum uncias duas,
coquantur ex aquae quantitate sufficienti, leni igne, ad Emplastri spissitudinem.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM ORDINARIUM

(*Emplastrum vesicatorium ordinarium*)

R. Cerae flavae uncias decem,
Terebinthinae,
Olei Olivarum, singulorum uncias tres.
In vase figulino colliquentur leni igne, liquefacta ab igne removeantur, et sub agitatione perpetua sensim et exacte admisceantur

Cantharidum recenter grosso modo tritarum unciae sex.
Formentur ex massa magdaleones et serventur.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM PERPETUUM

(*Emplastrum vesicatorium perpetuum*)

R. Terebinthinae,
Pulveris Mastiches, singulorum uncias sex,
leni calore liquatis immitte
Pulveris Cantharidum unciam unam cum dimidia,
Pulveris Euphorbii unciam unam.
Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CERUSSAE

(*Emplastrum album coctum*)

R. Olei olivarum libras duas,
Cerussae tritae libras quatuor.
Oleo calefacto injiciatur cerussa. Coquantur leni igne sub agitatione et jugi pauxilli aquae instillatione, ad Emplastri consistentiam; tunc adde
Cerae albae uncias sex;
colliquescant, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CICUTAE.

R. Cerae flavae libram unam,
Colophonii,
Olei olivarum, singulorum libram dimidiam,
colliquatis ac paulo refrigeratis admisce
Pulveris Herbae Cicutae virosae libram unam,
ut fiat Emplastrum.

Eodem modo paratur

EMPLASTRUM HYOSCYAMI,

CONII MACULATI.

EMPLASTRUM COMMUNE, s. DIACHYLON SIMPLEX.

R. Olei Olivarum libras sex,
Lithargyrii libras tres.

Coquantur leni igne, adjecto jugiter pauxillo aquae, in Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM

Vid. *Emplastrum gummosum.*

EMPLASTRUM DE EUPHORBIO

(*Emplastrum Ischiadicum*)

R. Picis nigrae uncias quatuor,
Euphorbii triti drachmam unam cum dimidia,
Terebinthinae Venetae drachmas sex,
colliquando misceantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM FOETIDUM.

R. Galbani uncias duodecim,
Tacamahacae tritae,
Cerae flavae, singulorum uncias sex,
Asae foetidae,
Seminum cumini contritorum,
Terebinthinae Venetae, singulorum uncias quatuor, colliquando
misceantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM GRISEUM

Vid. *Emplastrum de lapide calaminari.*

EMPLASTRUM GUMMOSUM

(*Emplastrum Diachylon compositum*)

℞. Emplastri communis libras duas,
Cerae flavae uncias quatuor.
Colliquatis addantur
Terebinthinae Venetae unciae duae,
Pulveris Gummi Ammoniaci,
Galbani, singulorum unciae duae,
Croci triti, in Spiritu Vini macerati et diluti, drachmae duae.
Commisceantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI

(*Emplastrum mercuriale*)

℞. Emplastri communis libram unam.
Leni igne in vase figulino vitreato liquefacto, sensim et sub continua agitatione admisceantur
Hydrargyri Terebinthina extincti uncia una cum dimidia.
Mixtione penitus peracta Emplastrum in magdaleones formatum servetur.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM

Vid. *Emplastrum de Euphorbio.*

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI

(*Emplastrum gryseum*)

R. Emplastri communis,
Lapidis calaminaris praeparati,
singulorum libram unam cum dimidia,
Cerae flavae uncias sex,
Sebi hircini,
Terebinthinae,
singulorum unciam unam cum dimidia.
Debito ordine colliquentur et commisceantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MELILOTI.

R. Sebi cervini libras quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Resinae pini libras sex,
Cerae flavae libras tres,
Gummi Ammoniaci uncias quatuor.
Liquatis et semirefrigeratis paullatim admisce
Pulveris Herbae et Florum Meliloti libras duas,
Absinthii libram unam,
ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE

Vid. *Emplastrum Hydrargyri.*

EMPLASTRUM MINII CAMPHORATUM

(*Emplastrum noricum*)

R. Minii subtilissime triti libram unam,

Olei olivarum libras duas,
Aceti vini semilibram,
ad emplastri mollioris consistentiam et colorem subfuscum coctis, addatur
Cerae flavae uncia una cum dimidia,
nondum plane refrigeratis immisceantur
Camphorae cum Oleo olivarum tritae drachmae duae.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM

Vid. *Emplastrum saponatum.*

EMPLASTRUM PICEUM

Vid. *Emplastrum sticticum.*

EMPLASTRUM SAPONATUM

(*Emplastrum miraculosum*)

R. Emplastri communis libras tres,
Cerae flavae libram dimidiam,
Saponis Hispanici uncias tres,
leni igne mixtis et aliquantulum refrigeratis adde
Camphorae unciam dimidiam in
Oleo olivarum pauxillo solutam.

EMPLASTRUM STICTICUM

(*Emplastrum piceum*)

R. Cerae citrinae,
Resinae pini,
Picis nigrae, singulorum libram unam,
Sebi hircini unciam unam cum dimidia,
liquata colentur, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM

Vid. *Emplastrum Cantharidum ordinarium.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM PERPETUUM.

Vid. *Emplastrum Cantharidum perpetuum.*

ESSENTIA ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii concisarum partem unam,
Spiritus Vini rectificati partes quatuor.

Digerantur leni calore per triduum; fortiter exprimantur et filtrentur.

Ad hanc normam parantur

ESSENTIA CENTAUREI MINORIS,
TRIFOLII FIBRINI.

ESSENTIA AMARA.

℞. Herbae Absinthii uncias duas,
Foliorum Cardui benedicti,
Radicis Gentianae,
Pomorum Aurantii immaturorum, singulorum unciam dimidiam.
Seminis Anisi drachmam unam,
incisis et contusis affundantur
Spiritus Vini Gallici librae tres,
digesta per triduum exprimantur et filtrentur.

ESSENTIA AROMATICA.

℞. Cassiae Cinnamomeae uncias duas,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Galangae,

Zingiberis, singulorum unciam dimidiam,
contusa digerantur cum
Spiritus Vini rectificati libris duabus.
Filtra et serva.

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. Asae foetidae electae et comminutae uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.
Leni calore per triduum digesta exprimantur et filtrentur.

Secundum hanc normam parantur
ESSENTIA CASTOREI,
MYRRHAE,
BENZOËS.

ESSENTIA CANTHARIDUM.

R. Pulveris Cantharidum drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias quatuor.
Lenissimo igne digerantur per biduum et filtrentur.

ESSENTIA CASTOREI AETHEREA.

R. Castorei genuini minutim concisi unciam unam,
Spiritus sulphurico-aetherei uncias sex.
Macera in vitro clauso, per dies octo, saepius subinde agitando, tum filtra et serva.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris Aurantiorum (Curassaviensium dictorum) uncias duas,
Spiritus Corticum Aurantiorum uncias decem.
Per quatriduum digesta exprimantur et filtrentur.

ESSENTIA CORTICUM CASCARILLAE.

R. Corticis Cascarillae concisae partem unam,
Spiritus Vini rectificati partes quinque.
Per quatriduum digesta exprimantur et filtrentur.

Ad eandem normam parantur

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI SIMPLEX,
CINNAMOMI,
GENTIANAE,
PIMPINELLAE,
VINCETOXICI,
LIGNI QUASSIAE,
GEI URBANI.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI COMPOSITA.

R. Pulveris Corticis Peruviani uncias quatuor,
Radicis Gentianae uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantiorum concisae unciam dimidiam.

Misceantur et infundantur
Spiritus Vini Gallici libris quatuor.
Digerantur in balneo arenae per sex dies; deinde colentur.

ESSENTIA SCILLAE.

R. Radicis Scillae siccatae concisae uncias sex,
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Leni calore per quatriduum digesta exprimantur et filtrentur.

Ad eandem normam paratur

ESSENTIA CORTICIS VIRIDIS NUCUM JUGLANDIS.

ESSENTIA STIBII

Vid. *Vinum Stibiatum.*

ESSENTIA VALERIANAE AMMONIATA.

R. Radicis Valerianae minoris recenter pulveratae uncias duas,
Liquoris Ammonii vinosi uncias duodecim,
digerantur frigide in cucurbita clausa per plures dies, vas saepius agitando.
Tincturam saturatam et colatam in vitro obturato serva.

EXTRACTUM ABSINTHII.

R. Summitatum Absinthii vulgaris minutim concisarum, quantum vis,
Aquae simplicis octuplum,
coquantur in vase stanneo per horae quadrantem et exprimantur. Residum ex Aquae quadruplo iterum per quadrantem horae leniter coque. Decocta prout subsederint colata, evaporent leni calore, ad extracti spissitudinem.

Pari modo parantur

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI,
CASCARILLAE,
CENTAURII MINORIS,
CHAMOMILLAE VULGARIS,
CORTICIS GEOFFREAE,
PERUVIANI,
FUMARIAE,
GENTIANAE,
HIPPOCASTANI,

EXTRACTUM MARRUBII,
MILLEFOLII,
RHEI,
TRIFOLII.

EXTRACTUM ACONITI.

R. Herbae Aconiti recentis ante florum eruptionem collectae, quantum placet,
contunde in mortario ferreo seu lapideo, cum tantillo aquae, succum exprime, ac leni sub continua agitatione ad formam extracti redige.

Ad hanc normam parantur

EXTRACTUM BELLADONNAE,
CICUTAE VIROSAE,
CONII MACULATI,
CHELIDONII,
DATURAE,
HYOSCYAMI,
NUCUM JUGLANDIS.

EXTRACTUM ALOËS

Vid. *Aloë depurata.*

EXTRACTUM CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum Aurantiorum libram unam,
incisis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae duae,
Aquae communis librae quatuor,
digesta in balneo aquae exprime, ex liquore colato Spiritum Vini e balneo aquae destillando elice, et residuum ad extracti consistentiam evapora.

Eodem modo para

EXTRACTUM COLUMBO,
HELLEBORI,
VALERIANAE.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

R. Ligni Guajaci rasurae, quantum vis,
Aquae communis decuplum,
coquantur in vase clauso vel Olla Papini per horam, et liquor coletur. Eodem modo coctio bis terve ex aqua recenti repetatur. Decocta colata in balneo aquae, continue sub finem spathula lignea agitando, evaporent ad extracti spissitudinem.

Eadem methodo paratur
EXTRACTUM QUASSIAE.

EXTRACTUM OPII
(*Opium depuratum*)

R. Opii crudi uncias quatuor,
in frustula minuta concisae immittantur cucurbitae vitreae, affundantur
Aquae communis librae quatuor.
Solutio filtrata lenissimo balnei calore ad extracti consistentiam evaporetur.

EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM
(*Loco Extracti catholici, panchymagogi et catharctici*)

R. Extracti Rhei uncias duas,
Aloës drachmas quinque;
mixtis adde

Saponis Jalappini in Spiritu Vini rectificato soluti unciam unam.
In balneo aquae evaporet agitando, ad extracti spissitudinem.

EXTRACTUM TARAXACI LIQUIDUM

(*Mellago Taraxaci*)

R. Radicum et Herbae junioris Taraxaci recentium libras decem,
concisis et contusis adde
Aquae communis libras sex.
Exprime succum, quem post unicam ebullitionem in vase stanneo cola, et leni calore ad syrupi consistentiam evapora.

Eodem modo paratur

MELLAGO vel EXTRACTUM GRAMINIS LIQUIDUM.

FEL BOVINUM INSPISSATUM.

Fel bovinum leni igne evaporetur ad Extracti consistentiam.

FERRUM OXYDATUM FUSCUM

(*Crocus Martis aperitivus*)

R. Crystallorum Ferri sulphurici, quantum vis.
Solve in aqua calida, filtra, et instillando
Liquorem Kali carbonici praecipita;
praecipitatum Aqua calida sedulo edulcora, sicca et serva.

FERRUM PULVERATUM

(*Limatura Martis praeparata*, *vel Chalybs praeparatus*)

Ferri purissimi in scobem redacti, quantum vis, in pulverem subtilissimum teratur, et in vitro obturato servetur.

FERRUM SULPHURICUM CRYSTALLISATUM

(*Vitriolum Martis*; *Sal Martis*)

R. Aquae communis libras quatuor,
in cucurbita vitrea immissis caute et gradatim instilla
Acidi sulphurici libram unam,
dein successive adde
Ferri puri, quantum ad Acidi saturationem sufficit.
Effervescentia plane finita liquor decantetur, filtretur et lege artis in crystallos redigatur. Crystalli ab accessu aëris seclusae usui serventur.

FLORES SULPHURIS

Vid. *Sulphur depuratum.*

GELATINA LIQUIRITIAE.

R. Radicum Liquiritiae exsiccatarum et excorticatarum unciam unam,
incisae macerentur per noctem in
Aquae fontanae fervidae libris quinque,
in colatura solvantur
Gummi Arabici electi librae quatuor,

Sacchari albi librae duae.

Colata coquantur ad dimidias. Ablata spuma effundatur Gelatina in capsulas lamineas, Oleo Amygdalino illitas, et leni calore exsiccetur.

GLOBULI TARTARI MARTIATI.

R. Ferri puri pulverati libram unam,

Tartari depurati in pulverem redacti libras tres,

Mixta in vase ferreo, aqua fervida humecta. Massam pultiformem exsicca, ac iterum in pulverem redige repetitis vicibus, ut fiat solutio ferri perfecta. Demum formetur in globulos.

HEPAR ANTIMONII

Vid. *Kali sulphurato-stibiatum.*

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

Vid. *Calcaria sulphurata.*

HEPAR SULPHURIS SALINUM

Vid. *Kali sulphuratum.*

HYDRARGYRUM MURIATICUM CORROSIVUM

(*Mercurius sublimatus corrosivus*)

R. Hydrargyri puri libras quinque,

Acidi sulphurici concentrati libras tres.

Abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massae residuae in mortario vitreo admisceantur

Natri muriatici siccati librae quatuor cum dimidia.

Sublimentur in cucurbita capaci, alembico instructa.

HYDRARGYRUM MURIATICUM MITE

(*Mercurius dulcis; Calomelas*)

R. Hydrargyri muriatici corrosivi partes quatuor,
Hydrargyri puri partes tres.

Misce terendo in mortario vitreo aut lapideo, spiritus vini aliquot guttulas subinde inspergendo, donec globuli Hydrargyri penitus disparuerint. Immitte cucurbitae, et sublima. Massam sublimatam tere, et denuo sublima; dein in pulverem subtilissimum redige, aqua destillata fervida probe lava, sicca, et in vase clauso serva.

HYDRARGYRUM MURIATICUM PRAECIPITATUM

(*Mercurius praecipitatus albus*)

R. Hydrargyri nitrici uncias octo,
solve in aquae destillatae quantitate sufficiente, et filtra. Solutioni admisce

Ammonii muriatici in aqua soluti uncias quatuor.

Liquori diluto sensim instilla

Natrum carbonicum, in aqua solutum, quantum ad praecipitationem sufficit.

Praecipitatum aqua destillata lava et sicca.

HYDRARGYRUM NITRICUM

(*Mercurius nitrosus*)

R. Hydrargyri puri unciam unam,
cucurbitae vitreae immisso affundatur

Acidi nitrici, quantum ad solutionem sufficit, cucurbita vasi imponatur aqua frigida repleto, et saepius agitetur, sic miscela solutioni per plures dies committatur. Crystalli, si quae formatae fuerint, solvantur, et liquido admisceantur. Liquor filtretur, in crystallos redigatur, quae loco frigido exsiccentur, et in vitro clauso serventur.

HYDRARGYRUM OXYDATUM RUBRUM

(*Mercurius praecipatus ruber*)

R. Hydrargyri puri libra unam,
Acidi nitrici, quantum sufficit ad perfectam solutionem.

Soluta ex retorta abstrahantur ad siccitatem, igne postremo in tantum aucto, ut Hydrargyrum in fundo retortae aequaliter induxerit rubrum splendidumque colorem.

HYDRARGYRUM OXYDATUM NIGRUM

(*Mercurius solubilis*)

R. Hydrargyri nitrici, quantum volueris, solve in aquae destillatae quantitate sufficiente, filtra. Liquori diluto sensim instilla
Liquoris Ammonii caustici, quantum sufficit ad hydrargyrum praecipitandum.

Pulverem aqua destillata fervida ablue, sicca, et in vitro clauso serva.

HYDRARGYRUM STIBIATO-SULPHURATUM

(*Aethiops antimonialis*)

R. Stibii sulphurati nigri pulverisati unciam unam.
Hydrargyri puri unciam dimidiam.
Misce terendo in mortario ferreo vel vitreo, usque quo omnes Hydrargyri globuli disparuerint.

HYDRARGYRUM SULPHURATUM NIGRUM

(*Aethiops mineralis*)

R. Sulphuris depurati,
Hydrargyri puri, partes aequales.
Terantur in mortario vitreo vel lapideo, donec Hydrargyrum plene dispareat.

INFUSUM SENNAE COMPOSITUM

(*Aqua laxativa*, *Decoctum laxativum Viennense*)

R. Foliorum Sennae electorum unciam unam et dimidiam,
Passularum minorum drachmas sex,
Seminis Coriandri drachmas duas,
Tartari solubilis drachmas quinque.
Incisis et contusis adfundantur
Aquae fontanae bullientis unciae viginti quatuor.
Per aliquot horas digesta bulliant leniter, ad colaturae expressae uncias quatuordecim, in qua solvantur
Mannae Calabrinae unciae quinque.
Iterum colentur.

KALI ACETICUM

(*Terra foliata Tartari*)

R. Kali carbonici, quantum placet,
Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam saturationem.

Liquor in vase porcellaneo evaporatione ad minorem quantitatem redactus, ope pulveris carbonum filtratus, lenissimo calore inspissetur. In vase bene clauso, loco calido servetur.

KALI CARBONICUM

(*Alcali vegetabile aëratum*, *Cineres clavellati depurati*, *Sal Tartari*, *Sal plantarum*)

Tartari crudi frustula in retorta terrea, crucibulo, aut charta humectata tantummodo obvoluta, inter carbones ardenter urantur, quousque fumus penitus desinit. Cineres remanentes contriti in aqua destillata solvantur, et liquor colatus ad siccitatem evaporetur. Perfecte Acido carbonico saturatum Kali obtinetur, si iterum in aquâ carbonata solvitur, et evaporando in crystallos redigitur.

KALI CAUSTICUM SICCUM

(*Lapis Causticus*)

R. Lixivii Kali caustici, quantum placet.

In vase ferreo mundissimo eo usque lente coquatur, donec guttula in laminam metallicam frigidam effusa statim indurescat; tunc massa crucibulo immittatur,

fortiorique igni committatur, donec instar olei, et colore rubicundo fluxerit; ita fluens subito effundatur in modulum peculiarem ferreum, antea calefactum, oleoque olivarum illitum, et antequam durescat, in frusta discindatur parva, quae adhuc calida in vitrum prius calefactum bene obturatum immissa, loco calido usui serventur.

KALI SULPHURATUM

(*Hepar sulphuris*, *Hepar sulphuris salinum*)

R. Sulphuris puri uncias octo,
Kali carbonici siccati libram unam.
Mixta in crucibulo amplo tecto leni igne funde, ut in massam coëant; quae in laminam lapideam vel aeneam effundatur, et frigefacta mox vasi vitreo probe claudendo immittatur.

KALI SULPHURATO-STIBIATUM

(*Hepar antimonii*)

R. Stibii sulphurati nigri,
Kali nitrici siccati, partes aequales.
Pulverata et mixta sensim immitte in crucibulum, inter prunas jam bene candentem: detonatione peracta, igne gradatim aucto, massa fundatur; quae frigefacta usui servetur.

KALI SULPHURICUM

(*Arcanum duplicatum*, *Tartarus vitriolatus*)

Massa salina post destillationem Acidi nitrici re-

manens, in aquae quantitate sufficiente coquendo solvitur, et Acidum, si abundat, cum Kali carbonico saturatur. Liquor filtretur, evaporetur, et ad crystallisationem in loco frigido seponatur. Collectae crystalli leniter exsiccentur.

KALI TARTARICUM

(*Tartarus tartarisatus*)

R. Kali carbonici uncias octo,
Aquae communis libras octo,
coquantur ad solutionem, inter bulliendum inspergendo
Tartari depurati triti, quantum ad perfectam saturationem sufficit.
Liquor filtratus evaporetur leni calore ad succum.

LAPIS CAUSTICUS

Vid. *Kali causticum siccum.*

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI

Vid. *Tinctura opii crocata.*

LAUDANUM LIQUIDUM WARNERI

Vid. *Tinctura opii ammoniata.*

LINIMENTUM AMMONITUM

(*Linimentum volatile*)

R. Olei Olivarum uncias duas,
Liquoris Ammonii caustici unciam dimidiam.
Misceantur.

LINIMENTUM AMMONIATO-CAMPHORATUM

(Linimentum volatile camphoratum)

R. Olei Olivarum uncias duas,
Camphorae drachmam unam,
Liquoris Ammonii caustici unciam dimidiam.
Misce.

LIQUOR AMMONII ACETICI

(Spiritus Mindereri)

R. Ammonii carbonici sicci uncias tres,
Paulatim instilletur, subinde agitando,
Aceti concentrati, quantum sufficit, donec non amplius effervescant.
Diluetur postea aqua destillata simplici, ut totius pondus sit unciarum viginti quatuor.

LIQUOR AMMONII CARBONICI AQUOSUS

(Spiritus Salis ammoniaci aquosus)

R. Kali carbonici libram unam cum dimidia,
Ammonii muriatici libram unam.
Immissis in retortam vitream, et probe mixtis, adde
Aquae communis libras octo.
Leni igne destillentur librae quatuor.

LIQUOR AMMONII CAUSTICUS

(Spiritus Salis ammoniaci cum calce)

R. Calcariae ustae libras duas,

asperge aqua, ut in pulverem fatiscat, dein misce in curcubita vitrea cum
Ammonii muriatici probe siccati et pulverati libras duabus,
Aquae communis libris tribus,
adaptetur alembicus, cum excipulo satis capaci
Aquae destillatae libram dimidiam continens, juncturisque bene clausis instituatur destillatio calore remissiori, qua Liquoris librae duae cum dimidia eliciantur, qui vase optime clauso servetur.

LIQUOR AMMONII PYRO-OLEOSI

(*Spiritus Cornu cervi rectificatus*)

Liquor ammonialis, ex destillatione cornu cervi aut aliorum ossium, una cum Ammonio sicco ac Oleo foetido obtentus et separatus, blando calore rectificetur.

LIQUOR AMMONII PYRO-OLEOSI SUCCINICI

(*Liquor Cornu cervi succinatus*)

R. Acidi Succini, quantum placet,
Liquoris Ammonii pyro-oleosi, quantum satis ad saturationem:
Filtra, et in vase probe clauso usui serva.

LIQUOR AMMONII VINOSUS

(*Spiritus Salis ammoniaci vinosus*)

R. Liquoris Ammonii caustici partem unam,

NATRUM PHOSPHORICUM

(*Soda phosphorata*)

R. Natri carbonici, quantum vis,
Acidi phosphorici diluti, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor filtratus ad crystallisandum evaporet; crystalli collectae in vase clauso serventur.

NATRUM SULPHURICUM CRYSTALLISATUM

(*Sal mirabile Glauberi*)

Residuum salinum ex destillatione Acidi muriatici obtentum conteratur et in aqua communi solvatur. Solutio Natri carbonici addatur, donec hoc aliquatenus praevaleat. Liquor filtratus ad pelliculam evaporet, et loco frigido ad crystallisandum seponatur. Crystallos collectas in vase clauso usui serva.

Nota. Aëri expositum aquam in crystallis contentam perdit, et in pulverem album fatiscit.

OLEUM ABSINTHII AETHEREUM.

R. Summitatum Absinthii recentium ante florum evolutionem decerptarum modiceque siccatarum libras decem,
Aquae communis libras sexaginta,

destillentur ex vesica, oleumque aquae innatans separetur. Aqua vero pro nova Absinthii copia iteratis destillationibus inservit.

Eodem modo parantur

OLEUM BACCARUM JUNIPERI,
FLORUM LAVENDULAE,
— HERBAE MAJORANAE,
MENTHAE CRISPAE,
PIPERITAE,
ORIGANI CRETICI,
RORISMARINI S. ANTHOS,
TANACETI,
THYMI,
SEMINIS ANISI,
CARVI,
FOENICULI,
nec non OLEUM CARYOPHILLORUM,
CINNAMOMI,
MACIS,
quod e retorta vitrea destilletur.

OLEUM ABSINTHII COCTUM.

℞. Herbae Absinthii recentis contusae libram unam,
Olei Olivarum libras tres;
coquantur sub continua agitatione spathula lignea, ad omnem humiditatis consumtionem. Oleum exprima, cola et serva.

Eadem methodo parentur

OLEUM CHAMOMILLAE VULGARIS,
HYOSCYAMI,
HYPERICI COCTUM.

OLEUM AMYGDALARUM.

Ex Amygdalis recentibus dulcibus vel amaris contusis, et cilicio inclusis, preli laminis aqua fervida calefactis, exprime oleum.

Similiter parentur

OLEUM FRUCTUUM FAGI, } ablato antea
SEMINUM RICINI, } cortice.
LINI,

OLEUM ANIMALE AETHEREUM

(Oleum animale Dippelii)

R. Olei animalis foetidi, quantum placet; infunde cucurbitae vitreae, ope infundibuli vitrei longo tubulo instructi, ne cucurbitae latera inquinentur. Tum alembico et excipulo, probe luto junctis, lenissimo balnei arenae calore, destilla tamdiu quam oleum limpidum transit. Oleum hoc eadem cautela, cucurbitae novae cum aquae quadruplo infundatur, et applicato alembico ac vase recipiente, destillatio repetatur, dum limpidissimum, aquae instar, prodit. Oleum aethereum in lagenulis vitreis exacte clausis et sub aqua demersis servetur.

OLEUM ANIMALE FOETIDUM

(Oleum Cornu cervi foetidum)

Obtinetur destillatione Cornu cervi una cum Ammonico sicco ac Liquore Ammonii pyro-oleoso.

OLEUM CACAO

(Butyrum Cacao)

R. Nucum sive Seminum Cacao, quantum placet. Leni igne tosti, a corticibus liberati et contusi, in vase ferreo leniter calefacti, in saccum immittantur,

et prelo, cujus laminae in aqua fervida calefactae sint, exprimantur. Oleum butyraceum sic obtentum cum aquae duplo digere in balneo arenae, donec a foecibus subsidentibus liberatum sit. Frigefactum ab aqua separa et usui serva.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae partem unam,
Olei Olivarum partes quatuor.
Terendo solvantur.

OLEUM CERAE.

R. Cerae flave rasae,
Calcariae ustae pulveratae, singularum libram unam;
fiat destillatio e retorta vitrea, arenae balneo immissa. Oleum elicitum nova destillatione supra
Calcariae ustae libram dimidiam,
rectifica.

OLEUM CORNU CERVI FOETIDUM

Vid. *Oleum animale foetidum.*

OLEUM MARTIS

Vid. *Liquor stypticus Loffii.*

OLEUM NUCISTAE

(*Oleum Nucis Moschatae*)

R. Nucum Moschatarum, quantum placet:
in mortario ferreo calido in pastam contusas, et sacculo cannabino inclusas, aquae bullientis vapore

impraegna, et prelo, laminis aqua fervida calefactis, exprime oleum.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem in aqua coctorum, quantum vis;
vitelli exemti, contriti, in sartagine calefacti, ope pistilli lignei agitentur, donec rufescant, vel pinguedinem exsudent: tum adhuc fervidos sacculo inclusos prelo subjice, oleumque elice.

OLEUM SUCCINI.

Oleum destillatione Acidi Succinici obtentum, cum aquae sextuplo mixtum, e retorta vitrea denuo destilla, et in vase probe clauso usui serva.

OPIUM DEPURATUM

Vid. *Extractum Opii.*

OXYMEL SCILLITICUM.

R. Mellis despumati uncias triginta.
Leni igne evaporatis, ad consumtionem circiter sex vel octo unciarum addantur
Aceti scillitici unciae duodecim.
Coquantur in vase figulino vitreato, ad consistentiam Syrupi tenuioris.

OXYMEL SIMPLEX.

Paratur uti Oxymel scilliticum, nisi quod, loco Aceti scillitici, Acetum vini illud ingrediatur.

PASSULAE LAXATIVAE.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor,
Coquantur in
Aquae simplicis unciis decem.
Versus finem coctionis addantur
Cinnamomi drachmae tres.
Expressa ebulliant cum
Sacchari albi libra una.
Syrupus colatus superfundatur Passularum minorum librae unae.

PASTA ALTHEAE.

R. Radicis Altheae concisae uncias tres,
infunde cum
Aquae bullientis libris octo
per noctem, et post unicam ebullitionem cola. In colatura solvantur
Gummi Arabici,
Sacchari albi, singulorum librae tres.
Cola, et spathula lignea continue agitando, leni calore ad Mellis consistentiam evapora, ut albescat; deinde admisce
Albumina quadraginta ovorum recentium in spumam quassata,
Aquae florum Aurantiorum uncias sex.
Lenissimo calore ad justam consistentiam sub perpetua agitatione inspissetur. Effunde in capsulas papyraceas, et loco calido penitus exsicca, tandem in taleolas scissa servetur.

PHOSPHORUS.

R. Acidi phosphorici libras tres,
in crucibulo fusis adde continue movendo
Pulveris carbonum libram unam.
Massam adhuc calidam in mortario lapideo tere, ac dein retortae figulinae loricatae immitte, cui, mediante luto pingui, excipulum applicetur amplum, aqua frigida paene repletum, et tubulo parvo in parte superiori munitum, per quem gas exire possit. Destillatio fiat igne aperto et sensim aucto ad retortae candescentiam, donec guttae transire cessent.

Phosphorus elicitus, si nondum satis purus appareat, rectificetur destillatione e retorta vitrea, blando arenae calore, in excipulum sufficienti Aquae quantitate repletum.

PILULAE APERIENTES s. CONTRA OBSTRUCTIONEM.

Ex Extracto Rhei composito formentur lege artis Pilulae ad pondus granorum duorum.

PILULAE AETHIOPICAE.

R. Hydrargyri puri drachmas sex,
Sulphuris stibiati aurantiaci unciam dimidiam.
In mortario vitreo ad perfectam globulorum exstinctionem tritis addantur et commisceantur
Saponis Hispanici,
Resinae Guajaci, singulorum uncia dimidia,
Syrupi communis, quantum sufficit,
ut fiat Massa, e qua formentur pilulae.

PILULAE FOETIDAE.

R. Asae foetidae drachmam unam cum dimidia,
Camphorae drachmam dimidiam.
Contusis tritisque addantur
Castorei Russici drachma una cum dimida,
Olei Cornu Cervi destillati guttae viginti quatuor.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE PURGANTES s. LAXANTES CUM MERCURIO.

R. Extracti Rhei compositi unciam unam,
Hydrargyri muriatici mitis unciam dimidiam,
Resinae Jalappae drachmam unam,
Olei Corticum Aurantiorum guttas triginta.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE RESOLVENTES.

R. Gummi Ammoniaci in aceto scillitico soluti et inspissati,
Saponis Hispanici,
Extracti Cicutae, singulorum partes aequales.
Misce, fiat Massa pilularis.

PILULAE SCILLITICAE.

R. Saponis Hispanici unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Pulveris Radicis Vincetoxici,
Scillae praeparatae, singulorum unciam dimidiam,
Balsami Copaivae drachmam unam.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE TONICO-NERVINAE.

R. Ferri sulphurici,
Asae foetidae,
Extracti Chamomillae, singulorum unciam dimidiam.
Misce, fiat Massa pilularis.

PLUMBUM ACETICUM

(*Saccharum Saturni*)

R. Minii partem unam,
Aceti vini partes octo,
coquantur in vase plumbeo, donec Acetum perfecte dulcescat. Colata evaporentur et crystallisationi committantur.

PULPA CASSIAE.

R. Fistularum Cassiae, quantum lubèt;
eximatur medulla cum seminibus, ac solvatur in
Aquae calidae sufficienti quantitate.
Trajiciatur per cribrum setaceum, lentoque igne ad mellis consistentiam redigatur; et singulis libris addantur
Sacchari albi unciae quatuor.
Coquantur ad pulpae consistentiam.

PULPA PRUNORUM.

Fructus pruni domesticae maturi, exemtis nucleis, coquantur ex aquae communis quantitate sufficienti. Liquidum per cribrum setaceum trajectum evaporèt ad requisitam spissitudinem. Singulis Pulpae libris addantur

Sacchari albi unciae quatuor.

Ad eandem normam paratur

PULPA TAMARINDORUM.

PULVIS ALTERANS EDINBURGENSIS.

R. Hydrargyri muriatici mitis, quantum volueris. Contrito in mortario lapideo, sub continua trituratione addantur paulatim

Sulphuris stibiati aurantiaci partes aequales.

Misce.

PULVIS AËRIPHORUS.

R. Natri carbonici sicci aqua crystallisationis orbati drachmas duas,

Pulveris Tartari depurati drachmas sex,

Sacchari albi vel Sacchari lactis unciam dimidiam.

Misce.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris Tartari depurati,

Radicis Iridis Florentinae, singulorum uncias duas,

Myrrhae,

Sanguinis draconis, singulorum unciam unam,

Olei Caryophyllorum guttas quadraginta.

Misce.

PULVIS DOWERI

Vid. *Pulvis Ipecacuanhae compositus.*

PULVIS JALAPPAE COMPOSITUS

(*Pulvis laxans*)

R. Radicis Jalappae praeparatae uncias duas,
Kali sulphurici unciam unam.
Misceantur in Pulverem.

PULVIS INFANTUM

Vid. *Pulvis Magnesiae compositus.*

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS s. PULVIS DOWERI.

R. Pulveris radicis Ipecacuanhae,
Opii, singulorum drachmam unam,
Sacchari candidi drachmas octo.
Misceantur in Pulverem.

PULVIS LAXANS

Vid. *Pulvis Jalappae compositus.*

PULVIS MAGNESIAE COMPOSITUS s. INFANTUM CUM RHEO.

R. Magnesiae carbonicae,
Elaeosacchari Foeniculi,
Pulveris Rhei, singulorum unciam dimidiam.
Misceantur in Pulverem.

PULVIS REFRIGERANS.

R. Pulveris Tartari depurati uncias tres,
Elaeosacchari Citri,
Nitri depurati, singulorum unciam dimidiam.
Misceantur et in vitro clauso serventur.

PULVIS TEMPERANS CAMPHORATUS.

R. Pulveris refrigerantis unciam unam et dimidiam,
Camphorae scrupulos duos.
Misce.

PULVIS VERMIFUGUS.

R. Florum Tanaceti,
Seminum Cynae, singulorum drachmas tres,
Ferri sulphurici drachmam unam.
Conterantur in Pulverem.

RESINA JALAPPAE.

R. Radicis Jalappae contusae, quantum volueris,
Spiritus Vini rectificati sextuplum.
Digerantur in balneo arenae ut extrahatur Tinctura. Repetatur digestio, donec omnis extracta fuerit Resina. Tincturae filtratae, e cucurbita vitrea leni calore dimidium destillatione abstrahatur. E residuo praecipitetur ope aquae affusae Resina, quae, aqua probe elota, lenissimo calore siccetur.

Eodem modo paratur

RESINA GUAJACI.

REGULUS ANTIMONII

Vid. *Stibium purum.*

ROOB JUNIPERI

Vid. *Succus Juniperi inspissatus.*

SACCHARUM CLARIFICATUM

Vid. *Syrupus sacchari depurati.*

SAL MARTIS

Vid. *Ferrum sulphuricum crystallisatum.*

SAL PLANTARUM

Vid. *Kali carbonicum.*

SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE

Vid. *Tartarus natronatus.*

SAL TARTARI

Vid. *Kali carbonicum.*

SAPO ANTIMONIALIS

Vid. *Sapo stibiatus.*

SAPO JALAPPINUS.

R. Resinae Jalappae,
Saponis Hispanici, singulorum uncias duas,
Spiritus Vini rectificati, quantum opus,
ut leni calore fiat solutio. Dein evapora, ad consistentiam Massae pilularis.

SAPO STIBIATUS

(*Sapo antimonialis*)

R. Sulphuris stibiati aurantiaci unciam unam,
Liquoris Kali caustici, quantum sufficit, ut digerendo fiat solutio; cui adde
Aquae destillatae fervidae pondus triplum,
Saponis Alicantini rasi uncias sex.
Solutionem leni calore ad massae pilularis consistentiam evapora. Si massa adhuc rubet, adde

Liquoris Kali caustici, quantum satis, ut colorem ex albido cinereum induat.

SODA PHOSPHORATA

Vid. *Natrum phosphoricum.*

SOLUTIO BARYTAE MURIATICAE s. LIQUOR TERRAE PONDEROSAE SALITAE.

℞. Barytae muriaticae scrupulum unum,
Aquae destillatae uncias duas.
Soluta filtrentur.

SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE s. PRO ENEMATE.

℞. Herbae Malvae libram dimidiam,
Meliloti,
Florum Sambuci,
Chamomillae, singulorum uncias octo,
Radicum Altheae uncias decem,
Seminum Lini libras tres,
Incidantur et contundantur simul in Pulverem grossiusculum.

SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

℞. Ligni Guajaci rasi uncias sex,
Sassafras,
Radicis Bardanae, singulorum uncias tres,
Liquiritiae drachmas tres,
Stipitum Dulcamarae unciam unam cum dimidia,
Seminis Foeniculi drachmas duas.
Incisa et contusa misceantur.

SPECIES FUMALES.

R. Ligni Rhodii uncias duodecim,
Radicis Iridis Florentinae uncias viginti,
Cassiae Ligneae,
Caryophyllatae, singulorum uncias quatuor,
Gummi Benzoës libras duas,
Storacis Calamitae uncias duodecim,
Succini citrini libram unam,
Olibani,
Mastichis, singulorum libras duas,
Florum Rosarum rubrarum,
Lavendularum, singulorum uncias sex.
Concisa et contusa misceantur.

SPECIES FUMALES OPTIMAE.

R. Gummi Storacis,
Benzoës, singulorum uncias duas,
Olibani,
Succini albi, singulorum unciam unam,
Olei de Cedro,
Lavendulae, singulorum guttas decem.
Concisa in pulverem grossiusculum misceantur.

SPECIES PRO INFUSO PECTORALI.

R. Radicum Altheae unciam cum dimidia,
Liquiritiae,
Herbae Tussilaginis,
Veronicae,
Florum Verbasci,
Sambuci, singulorum drachmas sex,

Seminis Anisi stellati unciam dimidiam.
Incisa et contusa misceantur.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE s. DISCUTIENTES.

R. Herbae Absinthii,
Melissae,
Menthae Piperitae,
Origani, singularum uncias quatuor,
Florum Chamomillae,
Sambuci,
Lavendulae, singulorum uncias tres.
Incisa et contusa misceantur.

SPIRITUS AROMATICUS s. ALEXITERIUS.

R. Cinnamomi uncias duas,
Flavedinis Corticum Citri,
Seminis Foeniculi, singulorum unciam unam,
Macis unciam dimidiam,
Menthae piperitae uncias tres,
Spiritus Vini Gallici libras duodecim.
Destillatione inde eliciantur librae octo.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Herbae Cocleariae recentis cum Floribus et Seminibus libras decem.
Contusis affundantur,
Spiritus Vini non rectificati librae viginti.
In vesica per noctem macerata destillentur, juncturis exacte clausis. Spiritus recenti Herbae affusus denuo destilletur, quod ad tertiam vicem repeti potest.

SPIRITUS CORNU CERVI RECTIFICATUS

Vid. *Liquor Ammonii pyro-oleosus.*

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum Aurantiorum Curassaviensium libram unam cum dimidia,
Spiritus Vini rectificati libras octo,
Aquae communis libras duas,
e vesica lento igne destillentur Spiritus librae octo, Aqua communi diluendae, ac Saccharo edulcorandae.

SPIRITUS LAVENDULARUM.

R. Florum Lavendularum leniter siccatorum libram unam,
Spiritus Vini non rectificati libras sex.
Per triduum digesta destillentur, e balneo arenae ad tertias, iterumque fiat destillatio super Florum recentium libram dimidiam.

Eodem modo parantur
SPIRITUS ROSISMARINI,
SERPYLLI.

SPIRITUS LAVENDULARUM COMPOSITUS.

R. Florum recentium Lavendularum libras duas,
Rorismarini libram unam,
Corticum Citri recentium uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duodecim.
Destillentur e balneo arenae ad siccitatem. In Spiritu destillato macerentur per triduum
Cinnamomi unciae tres,
Caryophyllorum aromaticorum,

Cubebarum, singulorum uncia una.
Colentur.

SPIRITUS MINDERERI

Vid. *Liquor Ammonii acetici.*

SPIRITUS MURIATICO-AETHEREUS

(*Spiritus Salis dulcis*)

R. Natri muriatici libram unam,
Magnesii oxydati nativi uncias sex,
in retortam vitream immissis affunde
Acidi Sulphurici concentrati uncias duodecim,
prius cum
Spiritus Vini rectificatissimi unciis quadraginta octo
mixtas. Destillent igne lenissimo unciae triginta sex.

SPIRITUS NITRI ACIDUS

Vid. *Acidum nitricum tenue.*

SPIRITUS NITRICO-AETHEREUS

(*Spiritus nitri dulcis*)

R. Acidi Nitrici partem unam,
instillando misce cum
Spiritus Vini rectificatissimi partibus quinque, ex retorta igne lenissimo destilla duas tertias partes. Spiritus elicitus supra Magnesiam ustam rectificetur.

SPIRITUS NITRI FUMANS

Vid. *Acidum nitricum concentratum.*

SPIRITUS SALIS ACIDUS

Vid. *Acidum muriaticum.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AQUOSUS

Vid. *Liquor Ammonii carbonici aquosus.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA PARATUS

Vid. *Liquor Ammonii caustici.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS

Vid. *Liquor Ammonii vinosus.*

SPIRITUS SALIS DULCIS

Vid. *Spiritus muriatico-aethereus.*

SPIRITUS SAPONATUS

Vid. *Balsamum saponatum.*

SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS

(*Liquor anodynus mineralis Hofmanni*)

R. Aetheris sulphurici partem unam,
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex,
misce et serva.

SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS CAMPHORATUS

(*Liquor Nervinus*)

R. Spiritus sulphurico-aetherei unciam unam,

in quo solve

Camphorae scrupulos quatuor.

In vitro probe clauso serva.

SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS MARTIATUS

(*Liquor anodynus martialis*)

R. Ferri puri limati, quantum placet,
solve in quantitate sufficiente

Acidi muriatici,

et evapora. Massam siccam in cellam repone, ut in liquorem coloris fusci saturati deliquescat. Liquorem obtentum cum

Aetheris sulphurici duplo

misce conquassando. Aetherem hoc modo ferro impraegnatum separa, et cum

Spiritus Vini rectificatissimi duplo

misce. Mixtum in vitris oblongis bene obturatis radiis solis tamdiu expone, donec color omnis evanuerit. Tum sollicite serva.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus Vini rectificati libras duas,

Camphorae uncias duas.

Solvantur.

SPIRITUS VITRIOLI

Vid. *Acidum sulphuricum dilutum.*

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

R. Spiritus Vini rectificati, quantum libet,

destillet igne leni dimidia pars, Spiritum elicitum supra

Calcariae muriaticae partem quartam

lenissimo igne rectifica.

SPONGIA CERATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata Cerae flavae liquefactae immergatur, fortiter exprimatur.

STIBIUM OXYDATUM SULPHURATUM VITRIFICATUM

(*Vitrum Antimonii*)

℞. Stibii sulphurati triti, quantum placet.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, sub jugi cum tenui pistillo vitreo agitatione, ne grumescat massa. Calcinatio protrahatur, donec fumi assurgere desinant, ac massa in calcem grisei coloris, sulphurem nón redolentem, mutata fuerit. Haec fortissimo igne in crucibulo fundatur, ac, pauxillo Sulphuris massae difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, ubi colorem pellucide hyacinthinum exhibet.

STIBIUM PURUM

(*Regulus Antimonii*)

℞. Frustolorum ferri puri uncias octo,

candentibus in crucibulo satis amplo paulatim adjiciantur

Stibii sulphurati grossiuscule comminuti unciae viginti quatuor. Optime fusis addantur

Kali nitrici quam maxime sicci unciae tres, perfecte fusa effundantur in conum fusorium sebo illitum, sub jugi hujus percussione, quo subsidat Metallum reductum. Hoc refrigeratum a scoriis separa, et in pulverem redige, admisce

Kali nitrici quam maxime sicci partem octavam, funde, atque a scoriis separa.

STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM LAEVIGATUM

(*Antimonium crudum praeparatum*)

Stibium sulphuratum nigrum electum, in mortario ferreo tritum, super porphyritem, affusa paululum aqua, laevigetur, donec particulae micantes disparuerint, loco tepido siccandum.

SUCCUS AURANTIORUM.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur Succus, atque defaecatus servetur in vitro angustioris colli, affuso Olei Olivarum pauxillo, vesica muniendo.

SUCCUS CITRI.

Paratur et servatur, uti Succus Aurantiorum.

SUCCUS JUNIPERI INSPISSATUS

(*Roob Juniperi*)

Baccae Juniperi recentes, maturae, conquassatae, coquantur in aqua communi. Succus colatus et expressus, addita Sacchari albi quarta parte, leni igne inspissetur ad Mellis consistentiam.

Eodem modo parantur

SUCCUS MORORUM INSPISSATUS S. ROOB MORORUM,

SUCCUS INSPISSATUS SAMBUCI S. ROOB SAMBUCI.

SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

Succus Liquiritiae Hispanicus in frustula dissectus, et aqua tepida solutus, per pannum coletur. Faecibus subsidentibus liquor decantetur, ac leni calore inspissetur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII

Vid. *Sulphur stibiatum aurantiacum.*

SULPHUR DEPURATUM

(*Flores Sulphuris loti*)

Sulphur sublimatum, quale prostat, Aqua fervida ab acido adhaerente perfecte libera et siccatum serva.

SULPHUR PRAECIPITATUM

(*Lac Sulphuris*)

R. Kali sulphurati, quantum vis,
solve in
Aquae fervidae partibus viginti,
Liquori filtrato paulatim instilla
Acidi sulphurici diluti, quantum ad praecipitandum sufficit.

Praecipitatum probe edulcoratum et lenissimo calore siccatum usui serva.

SULPHUR STIBIATUM AURANTIACUM

(*Sulphur auratum Antimonii.*)

R. Stibii sulphurati nigri laevigati partes duas,
Sulphuris depurati partes tres,
Liquoris Kali caustici, quantum ad solutionem requiritur.

Mixta coque in lebeto ferreo, continue movendo spathula, ut fiat solutio perfecta; dein liquori aqua fervida diluto, et per chartam colato, instilla paulatim

Acidi sulphurici diluti, quantum ad praecipitandum sufficit.

Praecipitatum aqua tepida perfecte abluetur, lenissimo calore siccetur, ac in vase clauso usui servetur.

SULPHUR STIBIATUM AURANTIACUM LIQUIDUM

Vid. *Liquor Saponis stibiati.*

SULPHUR STIBIATUM RUBRUM

(*Kermes minerale*)

R. Stibii sulphurati nigri libram unam,
Sulphuris depurati uncias tres,
Kali carbonici libram unam cum dimidia.

Mixta et pulverisata injice in crucibulum, ut igne moderato cito liquescant. Massam fusam in mortarium ferreum effunde, et postquam refriguerit, in pulverem tere, quem in Aquae libris octo coque per semihoram, continue movendo; dein liquorem

adhuc fervidum per pannum linteum filtra in vas, cui Aquae communis librae sedecim insunt, ac contectum in vase haud profundo, per quadraginta octo horas sepone. Praecipitatum rubeo-fuscum aqua tepida ablue, caute sicca, et in vase obturato usui serva.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

R. Succi Citri depurati et filtrati uncias decem,
Sacchari albissimi uncias sedecim.

Mixta post unam alteramve ebullitionem in vase stanneo colentur.

Ad eandem normam parantur

SYRUPUS BERBERUM,
CERASORUM ACIDORUM,
FRAGARUM,
MORORUM,
RIBIUM,
RUBI IDAEI.

SYRUPUS DE ALTHEA.

R. Radicis Altheae decorticatae uncias tres,
Aquae fontanae libras sex.

Coquantur ad tertiae partis consumtionem, sub finem addendo

Radicis Liquiritiae uncias tres.

Colaturae subsidentia depuratae addantur

Sacchari albi librae sex.

Coquantur leni igne sub continua agitatione, donec fiat Sirupus.

SYRUPUS AMYGDALARUM

(*Syrupus emulsivus*)

R. Amygdalarum dulcium excorticatarum uncias octo, in mortario lapideo pistilli lignei ope contusis, sensim adde

Aquae Rosarum libras duas,
Florum Aurantii unciam unam.

In emulsionis colatae unciis viginti solve

Sacchari albissimi libras tres,

calore lenissimo fiat Syrupus.

SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Flavedinis corticum Aurantiorum concisae uncias octo,

Aquae fontanae ferventis libras duas.

Digerantur vase clauso per sex horas. Colaturae addantur

Sacchari albi librae quatuor,

ut fiat Syrupus.

SYRUPUS DIACODION, s. PAPAVERIS ALBI.

R. Capitum Papaveris albi modice siccatorum uncias quatuordecim,

Radicis Liquiritiae unciam dimidiam,

Aquae fontanae bullientis libras octo.

Per noctem macerata coquantur ad dimidias. Colaturae fortiter expressae addantur

Sacchari albi librae quatuor.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS E MANNA.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor,
Seminis Foeniculi,
Zingiberis, singulorum drachmam unam,
Aquae fervidae libras duas.
Digesta exprimantur. Clarificata, demum admistis
Mannae Calabrinae unciis sex,
Sacchari albi unciis viginti duabus,
coquantur in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS.

R. Florum Papaveris erratici recentium libram unam cum dimidia,
Aquae simplicis destillatae ferventis libras tres.
Per noctem macerata exprimantur, et colaturae ad dimidias evaporatae addantur
Sacchari albi librae tres.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS RHEI.

R. Radicis Rhei concisi uncias quatuor,
Kali carbonici drachmas duas.
Affunde
Aquae bullientis libras duas,
ebulliet leni igne. Expressis unciis viginti immisceantur
Sacchari albi librae tres,
et fiat Syrupus,

SYRUPUS SACCHARI, s. SACCHARUM CLARIFICATUM.

R. Sacchari albi,

Aquae fontanae, singulorum partes aequales.
Coquantur in Syrupum.

TARTARUS AMMONIATUS

(Tartarus solubilis ammoniacalis)

R. Tartari depurati triti, quantum placet,
Aquae communis octuplum,
coquantur in vase stanneo, solutis successive admisceatur
Ammonii carbonici quantitas sufficiens,
ad saturationem usque. Liquor filtratus et vasi porcellaneo immissus in balneo arenae sub agitatione ad siccitatem evaporetur. Sal siccum in vitro arctissime clauso servetur.

TARTARUS BORAXATUS

(Cremor Tartari solubilis)

R. Boracis pulveratae libram semis,
Aquae communis libras sex,
vase stanneo ingerantur et coquantur; sub ebullitione inspergatur
Pulveris Tartari depurati libra una cum dimidia
vel quantum sponte solvitur.
Liquor filtretur, et in vase porcellaneo leni calore evaporetur. Sal siccum in pulverem tritum in vitro optime claudendo servetur.

TARTARUS EMETICUS

Vid. *Tartarus stibiatus.*

TARTARUS NATRONATUS

(*Sal Polychrestum de Seignette*)

R. Natri carbonici crystallisati libram unam,
Aquae fontanae libras octo.

Solutio filtrata in vase figulino ebulliat. Inter bulliendum inspergatur

Tartari depurati, quantum sufficit ad saturationem.

Solutio denuo filtrata, ad tertias evaporata, crystallisationi committatur.

TARTARUS SOLUBILIS AMMONIACALIS

Vid. *Tartarus ammoniatus.*

TARTARUS STIBIATUS

(*Tartarus emeticus*)

R. Stibii oxydulati sulphurati vitrei triti unciam unam cum dimidia,
Pulveris Tartari depurati uncias duas.

In vase porcellaneo immissis admisce

Aquae destillatae quantum requiritur,

ut fiat massa pulti similis. Seponatur vas loco calido per tres hebdomadas, massa saepius agitetur spathula lignea, et addatur sensim aqua, loco evaporatione consumptae. Dein Aqua fervida diluta filtretur, et residuum abluatur. Liquor evaporetur et loco frigido ad crystallisandum seponatur. Crystalli per vices obtentae in pulverem tritae, vitro clauso serventur.

TARTARUS TARTARISATUS

Vid. *Kali tartaricum.*

TARTARUS VITRIOLATUS

Vid. *Kali sulphuricum.*

TERRA FOLIATA TARTARI

Vid. *Kali aceticum.*

TERRA FOLIATA TARTARI CRYSTALLISATA

Vid. *Natrum aceticum.*

TERRA PONDEROSA SALITA

Vid. *Baryta muriatica.*

THEA AMARA.

R. Rasurae ligni Guajaci,
Baccarum Juniperi,
Foliorum Sennae,
Herbae Trifolii fibrini, singulorum partes aequales,
concisa et contusa misce.

TINCTURA ANTIMONII JACOBI

Vid. *Liquor saponis stibiati.*

TINCTURA BENZOËS COMPOSITA

(*Balsamum Commendatoris; Balsamum traumaticum.* Angl. *Turlington Balsam; Friars Balsam*)

R. Benzoës uncias tres,

Styracis in granis unciam unam et dimidiam,
Aloës depuratae unciam dimidiam,
Balsami Indici nigri unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi libras tres.

In vase clauso digere per triduum, deinde per chartam cola.

TINCTURA CATHARTICA.

R. Foliorum Sennae uncias duas,
Radicis Jalappae unciam dimidiam,
Spiritus Vini rectificati libras tres.

Digerantur per triduum, et Tincturae colatae addantur
Sacchari albi unciae quatuor.

TINCTURA FERRI ACETICI AETHEREA

(*Aether aceticus martialis*)

R. Ferri pulverati uncias quatuor,
solve in
Acidi acetici concentrati quantitate sufficiente.
Solutionis unciis novem admisce
Aetheris acetici unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias duas.
Misce.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA

(*Tinctura Guajaci volatilis*)

R. Resinae Guajaci nativae tritae unciam unam,
Liquoris Ammonii vinosi uncias sex.

Frigida digestione in vitro clauso saepius movendo extrahatur Tinctura.

TINCTURA GUAJACI SPIRITUOSA.

R. Resinae Guajaci nativae tritae unciam unam,
Spiritus Taffiae, s. Sacchari veteris libram unam,
digerantur et serventur.

TINCTURA OPII AMMONIATA

(*Laudanum Liquidum Warneri*)

R. Opii puri,
Saponis Alicantini, singulorum drachmas sex,
Nucis Moschatae contusae drachmam unam,
Camphorae drachmas duas,
Croci concisi grana quadraginta,
Liquoris Ammonii vinosi uncias novem.
Digerantur per dies decem, interdum conquassando, et decantentur.

Nota. Drachma contiuet Opii grana quinque cum dimidio.

TINCTURA OPII CROCATA

(*Laudanum liquidum Sydenhami*)

R. Extracti Opii uncias duas,
Croci optimi semunciam,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum, singulorum drachmam unam.
In pulverem trita infundantur
Vini Hispanici libra una.

Digerantur per triduum vel quatriduum; deinde colentur et exprimantur.

Nota. Drachma continet opii grana decem.

TINCTURA OPII SIMPLEX.

R. Opii unciam unam,
Vini Hispanici uncias duodecim,
digerantur per triduum et serventur.

Nota. Drachma grana decem Opii continet.

TINCTURA OPII SPIRITUOSA.

R. Opii unciam dimidiam,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti quatuor,
digerantur et serventur.

Nota. Drachma grana quatuor Opii circiter continet.

TINCTURA RHABARBARI AQUOSA

(Antea *Anima Rhei*)

R. Rhabarbari electi tenuiter incisi unciam unam,
Kali carbonici drachmas duas,
Aquae fontanae bullientis uncias decem.
Post unicam ebullitionem colentur.

TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

R. Rhabarbari electi uncias duas,
Radicis Gentianae drachmas sex,
Seminum Cardamomi minoris unciam dimidiam,
Vini albi libras duas,
digerantur leni calore et filtrentur.

UNGUENTUM ALTHEAE.

R. Mucilaginis Radicum Altheae,
Seminis Lini, singulorum libram unam,
Axungiae porcinae libras sex.
Coquantur ad consumtionem omnis aquosi; deinde addatur
Resinae flavae semilibra.
Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM.

R. Colophonii,
Cerae flavae,
Sevi ovilli,
Picis nigrae, singulorum libram unam,
Terebinthinae libram dimidiam,
Olei Olivarum libras tres.
Leni igne liquata colentur.

UNGUENTUM CERUSSAE

(*Unguentum album simplex*)

R. Axungiae porcinae libram unam,
Cerussae libram dimidiam.
Leni igne soluta et deinde perfecte refrigerata misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM CERUSSAE CAMPHORATUM

(*Unguentum album camphoratum*)

R. Unguenti Cerussae frigefacti uncias duas,

Camphorae cum paucis Olei Amygdalarum guttulis tritae grana viginti quatuor.

Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM DIGESTIVUM

Vid. *Balsamum Terebinthinatum.*

UNGUENTUM HYDRARGYRI CINEREUM

(*Unguentum mercuriale* s. *Neapolitanum*)

R. Hydrargyri puri,
Sevi bovini, singulorum unciam unam,
Axungiae porcinae uncias tres.

Mercurius primum cum Sevo et pauxillo Axungiae porcinae probe exstinguatur; deinde Axungia reliqua addatur, et terendo misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI CITRINUM.

R. Hydrargyri puri unciam unam,
Acidi nitrici uncias duas,

solve digerendo; solutioni calidae admisce
Axungiae porcinae recenter liquefactae et jam in coagulationem tendentis uncias duodecim.

UNGUENTUM HYDRARGYRI RUBRUM

(*Balsamum Ophthalmicum rubrum*)

R. Butyri recentis omni Sale privati uncias tres, liquefacto leni igne, adde
Hydrargyri oxydati rubri in subtilissimum pulverem redacti drachmas tres.

Exactissime in Mortario vitreo vel lapideo misceantur et diu terantur, donec perfecte refriguerint.

UNGUENTUM MERCURIALE

Vid. *Unguentum Hydrargyri cinereum.*

UNGUENTUM NEAPOLITANUM

Vid. *Unguentum Hydrargyri cinereum.*

UNGUENTUM OPHTHALMICUM RUBRUM

Vid. *Unguentum Hydrargyri rubrum.*

UNGUENTUM RORISMARINI COMPOSITUM

(*Unguentum nervinum*)

R. Herbae Rorismarini uncias duas,
Rutae,
Majoranae,
Menthae crispae,
Florum Meliloti,
Lavendulae,
Chamomillae,
Baccarum Lauri, singulorum unciam unam,
Axungiae porcinae libram unam,
Sevi ovilli libram dimidiam,
coque lento igne, donec aquosum consumtum sit.
In colatura expressa liquescant
Cerae flavae,
Terebinthinae, singulorum unciae duae,
Olei Laurini unciae quatuor,
misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Sacchari Saturni unciam unam cum dimidia,

Cerae albae uncias tres,
Olei Olivarum uncias duodecim.
Liquata misce sub continuo motu ad refrigescentiam.

UNGUENTUM SULPHURIS

(*Unguentum ad Scabiem*)

R. Axungiae porcinae saepius lotae uncias decem,
Radicis Enulae in pulverem redactae uncias duas,
Baccarum Lauri contusarum,
Sulphuris triti, singulorum unciam unam,
Liquoris Kali carbonici semunciam.
Misceantur.

UNGUENTUM ZINCI

(*Unguentum Nihili*)

R. Zinci oxydati albi pulverati unciam unam,
Camphorae tritae scrupulum unum,
Axungiae porcinae uncias sex.
Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM ZINCI SULPHURATUM

(*Unguentum contra Scabiem Jasseri*)

R. Axungiae porcinae libram unam,
Florum Sulphuris uncias duas,
Zinci sulphurici subtiliter pulverati unciam unam.
Misceantur in Unguentum.

VINUM STIBIATUM

(*Aqua benedicta Rulandi; Vinum emeticum; Essentia Stibii*)

R. Tartari stibiati grana viginti sex,
Vini Hispanici libram unam,
solve leni digestione et filtra.

VITRIOLUM MARTIS

Vid. *Ferrum sulphuricum.*

VITRUM ANTIMONII

Vid. *Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.*

ZINCUM OXYDATUM ALBUM

(*Flores Zinci*)

R. Zinci sulphurici quantum vis,
solve in
Aquae fervidae decuplo,
filtra et instilla sensim
Natri carbonici, in sufficiente quantitate Aquae soluti, quantum satis, ut praecipitetur oxidum Zinci. Praecipitatum probe edulcoratum et siccatum usui serva.

INDEX

DANSK REGISTER

I

K

L

U

V

Z

DEUTSCHES REGISTER

H

I

K

Q

R

S

SELECTUS MEDICAMINUM

QUAE

IN OMNIBUS MINORIBUS PHARMACOPOLIIS
PRAESTO ESSE DEBENT

Acetum concentratum.
— crudum.
— saturninum.
— saturninum concentratum.
— scilliticum.
Acidum muriaticum.
— nitricum tenue.
— succinicum.
— sulphuricum concentratum.
— sulphuricum dilutum.
— tartaricum.
Aerugo.
Aether sulphuricus.
Agaricus.
Aloë sucotrina.
Alumen crudum.
— ustum.
Ammoniacum.
Ammonium carbonicum.
Ammonium carbonicum pyro-oleosum.
— muriaticum.
Amygdalae amarae.
— dulces.
Amylum.
Aqua calcariae ustae.
— cinnamomi simplex.
— destillata.
— foeniculi.
Aqua menthae crispae.
— menthae piperitae.
— petroselini.
— rosarum.
— sambuci.
— saturnina.
Argentum nitricum fusum.
Arsenicum album.
Asa foetida.
Asphaltum.
Axungia porci.
Baccae juniperi.
— lauri.
Balsamum copaivae.
— peruvianum.
— saponaceum.
— terebinthinatum.
— universale.
— vitae externum.
Baryta muriatica.
Borax.
Butyrum majoranae.
Calx.
Camphora.
Cantharides.
Carbo praeparatus.
Cardamomi minores.
Caricae.
Caryophylli.
Cassia fistula.
Castoreum russicum.

Cepae.
Cera alba.
— flava.
— ad labia.
Ceratum saturni.
Cerussa alba.
Clavelli cinnamomi.
Colla piscium.
Comae lupuli.
Cornu Cervi.
— sine igne praeparatum.
Cortex aurantiorum.
— cascarillae.
— chinae fuscus.
— chinae flavus sive regius.
— cinnamomi.
— mezerei.
— nucum juglandis viridis.
— quercus.
— salicis.
Creta alba.
Crocus.
Cuprum sulphuricum.
Electuarium aperiens.
— theriaca.
Elixir acidum.
— pectorale.
Emplastrum adhaesivum.
— cantharidum ordinarium.
— cantharidum perpetuum.
— cerussae.
— cicutae.
— commune.
— diachylon gummosum.
— hydrargyri.
— de lapide calaminari.
— meliloti.
— miraculosum.
— piceum.
Euphorbium.
Essentia absinthii.
— amara.
Essentia asae foetidae.
— cantharidum.
— castorei.
— cinnamomi.
— corticis peruviani simplex.
— corticis peruviani composita.
— corticis aurantiorum.
— corticis cascarillae.
— radicis gei urbani.
— myrrhae.
— pimpinellae.
— scillae.
Extractum absinthii.
— aconiti.
— cardui benedicti.
— chamomillae.
— conii maculati.
— corticis peruviani.
— graminis liquidum.
— hyoscyami.
— nucum juglandis.
— taraxaci liquidum.
Fel bovinum inspissatum.
Ferrum pulveratum.
— sulphuricum.
Flores arnicae.
— chamomillae vulgaris.
— lavendulae.
— rosarum.
— sambuci.
— verbasci.
Folia quercus.
— sennae.
— ribis nigri.
Galbanum.
Gallae.
Gelatinae liquiritiae.
Glandes quercus.
Gummi arabicum.
— guajaci.
— guttae.

Herba absinthii.
— aconiti.
— altheae.
— cardui benedicti.
— chamomillae vulgaris.
— cicutae aquaticae.
— cicutae terrestris.
— farfarae.
— gratiolae.
— hyoscyami.
— majoranae.
— malvae.
— melissae.
— menthae crispae.
— menthae piperitae.
— millefolii.
— nicotianae.
— salviae.
— scordii.
— thymi.
— trifolii fibrini.
— veronicae.
— violae tricoloris.
Hirudines.
Hydrargyrum muriaticum corrosivum.
— muriaticum mite.
— oxydatum rubrum.
— oxydatum nigrum.
— stibiato-sulphuratum.
— sulphuratum nigrum.
Infusum sennae compositum.
Kali aceticum.
— carbonicum depuratum.
— nitricum depuratum.
— tartaricum.
Lapis calaminaris.
Lapides cancrorum.
Lignum guajaci.
— quassiae.
— sassafras.
Linimentum ammoniatum.
Linimentum ammoniato camphoratum.
Liquor ammonii acetici.
— ammonii carbonici aquosus.
— ammonii causticus.
— ammonii pyro-oleosi.
— ammonii succinici.
— stibii muriatici.
Lithargyrium.
Lycopodium.
Macis.
Magnesia carbonica.
— sulphurica.
Magnesium oxydatum nigrum.
Maltum.
Manna.
Mel album.
— commune.
— despumatum.
Minium.
Moschus.
Muscus islandicus.
Myrrha.
Nitrum aceticum.
— carbonicum.
— sulphuricum.
Nuces moschatae.
— vomicae.
Oleum absinthii coctum.
— amygdalarum.
— animale aethereum.
— animale foetidum.
— anisi.
— anthos.
— asphalti.
— baccarum juniperi.
— caryophyllorum.
— de cedro.
— chamomillae coctum.
— foeniculi.
— hyoscyami.

Oleum hyperici.
— laurinum expressum.
— lini.
— olivarum.
— ovorum.
— raparum.
— ricini.
— terebinthinae.
Opium.
Oxymel scilliticum.
— simplex.
Passulae laxativae.
Pasta altheae.
Pilulae aperientes.
Piper nigrum.
Pix solida.
Plumbum aceticum.
Poma aurantia immatura.
— colocynthidis.
Pulpa cassiae.
— tamarindorum.
Pulvis jalappae compositus.
— magnesiae compositus.
— refrigerans.
— temperans camphoratus.
Radix altheae.
— angelicae.
— armoraciae.
— bardanae.
— calami aromatici.
— caryophyllatae.
— chinae.
— enulae.
— gentianae.
— glycyrrhizae.
— graminis.
— gratiolae.
— jalappae.
— ipecacuanhae.
— iridis florentinae.
— pimpinellae.
— rhabarbari.
— saleb.
Radix scillae.
— senegae.
— taraxaci.
— valerianae sylvestris.
— zingiberis.
Resina guajaci nativa.
— jalappae.
— pini.
Sapo alicantinus.
— stibiatus.
Scammonium.
Semen anisi.
— anisi stellati.
— cannabis.
— carvi.
— cynae.
— foeniculi.
— foenugraeci.
— lini.
— papaveris albi.
— petroselini.
— sabadillae.
— sinapi albi anglici.
— tanaceti.
Sevum bovinum.
— ovillum.
Species pro cataplasmate emolliente.
— pro decocto lignorum.
— fumales.
— pro infuso pectorali.
— resolventes externae.
Spiritus cochleariae.
— lavendulae simplex.
— lavendulae compositus.
— muriatico-aethereus.
— sulphurico-aethereus.
— sulphurico-aethereus-camphoratus.
— vini camphoratus.
— vini rectificatus.
— vini rectificatissimus.
Spongia cerata.

Spongia marina.
Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.
— sulphuratum nigrum.
Stipites dulcamarae.
Succinum.
Succus berberum.
— juniperi inspissatus.
— liquiritiae depuratus.
— sambuci inspissatus.
Sulphur citrinum.
— depuratum.
— praecipitatum.
— stibiatum rubrum.
Syrupus altheae.
— berberum.
— cerasorum.
— diacodion.
— mannae.
— rhei.
— sacchari depurati.
— rubi idaei.
Tamarindi.
Tartarus depuratus.
Tartarus natronatus.
— stibiatus.
Terebinthina cocta.
— communis.
Tinctura guajaci spirituosa.
— opii crocata.
— opii spirituosa.
— rhabarbari aquosa.
— rhabarbari vinosa.
Unguentum altheae.
— basilicum.
— cerussae.
— cerussae camphoratum.
— hydrargyri rubrum.
— rosmarini compositum.
— saturninum.
— sulphuris.
Vinum gallicum album.
— malacense.
— stibiatum.
Zincum oxydatum album.
— purum.
— sulphuricum.